

ଭନୱତ ପକ୍ଷଟିରେ ପରିବା ଚାଷ



କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭନୱତ ଚାଷ ପକ୍ଷଟି
ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ସହାୟକ ପୁଷ୍ଟିକା



BRLF

ପ୍ରାଣ
Pradan

PROFESSIONAL ASSISTANCE
FOR DEVELOPMENT ACTIVITY



16 partners NGO

ସୂଚୀପତ୍ର

କ୍ର.ନଂ	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
୧.	ପରିଚୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି	୨-୯
୨.	ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ବାଲ୍ୟଶିଳ୍ପ ଚାଷ	୧୦-୨୦
୩.	ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ କୋବି ଚାଷ	୨୧-୨୭
୪.	ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ	୨୮-୪୧
୫.	ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ଲତା ଜାତୀୟ ଚାଷ	୪୨-୫୪
୬.	ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ	୫୫-୬୬
୭.	ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ଡରଭୁଜ ଚାଷ	୬୭-୭୭
୮.	ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ଖମ୍ବିଆଳୁ ଚାଷ	୭୮-୮୧
୯.	ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ପୋଟଳ ଚାଷ	୮୨-୮୮
୧୦.	କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର ବିଧି	୮୯
୧୧.	ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା	୯୦-୯୭
୧୨.	ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ର କିଛି ନିୟମାବଳୀ	୯୮

ପନିପରିବା ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି



ପନିପରିବା ତଳି ପକାଇବା ବିଧି

ଉନ୍ନତ ତଳି ବା ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉର୍ବର ମାଟି, ଉନ୍ନତ ବିହନ, ଖାଦ୍ୟ, ପୋକ ଓ ରୋଗ ପରିଚାଳନା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଚାରା ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ଓ ନିମ୍ନ ମାନର ହୋଇଥାଏ । ଏହାଛଡା ଉନ୍ନତ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଦରକାର । ଛୋଟ ମଞ୍ଜିଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା, ଯେପରିକି ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଶିମିଳା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତଳି ପକାଯାଏ ।

- * ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଖେତରେ ବୁଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାଏ ।
- * ସୁସ୍ଥ ଚାରା ଲଗାଇଲେ ଅମଳ ବଢିଥାଏ ।
- * ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତଳି ପକାଇଲେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ସହ ସୁସ୍ଥ ତଳି ମିଳିଥାଏ ।
- * ମୁଖ୍ୟ ଖେତରେ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତଳିର ତଳି ପଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧକ ପାଇପାରେ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଳି ବା ନର୍ସରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି :

- * ବେଡ ନର୍ସରୀ



ପରିସରିବା ତଳି ପକାଇବା ବିଧି

ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଚୟନ :

- * ପାଣି ଜମୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- * ପ୍ରତିଦିନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିହେଉଥିବା ଜାଗାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- * ଜମିଟି ପାଖରେ ଜଳ ଏବଂ ଜଳ ସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- * ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- * କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଘୁଷୁରି, କୁକୁର, ଛେଳି ଆଦିଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- * ବିହନ ପକାଇବାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ନିମ୍ନ ପିଡିଆ ଓ ଗୋବରଖତ ଏକ ଝୁଡ଼ି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ବିହନ ବିଶୋଧନ :

- * ବିହନ ବିଜମୃତରେ ପକାଇ ସଂଗେ ସଂଗେ ଉଠାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ।
- * ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଋତୁରେ ଅଧାଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ସୁତୋମୋନାସ୍ ଫ୍ଲୁରୋସେନ୍ସ ୧ ଗ୍ରାମ୍ରେ ବିହନରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- * ବିହନରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଆଜୋକ୍ସିରିଲମ୍‌କୁ ପେଜରେ ମିଶାଇ ବିହନକୁ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ।



ସାର ପରିଚାଳନା

- * ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଡିଏପି
- * ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ପୋଟାସ୍
- * ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଫୋରେଟ୍
- * ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରିଡୋମିଲ୍

ଡିଏପି, ପୋଟାସ୍ ଏବଂ ଫୋରେଟ୍‌କୁ ତଳିପଟି ଉପରେ ପକାଇ ମାଟିର ୧ ଇଞ୍ଚ ଉପରସ୍ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାଟିରେ ଥିବା କୀଟ ଯଥା ପିଣ୍ଡୁଡି, ଉଇ, ଛୋଟ ପୋକ ଯାହାକି ତଳିକୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ତଳିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଫୋରେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ବିହନ ଉପଚାର ଏବଂ ବୁଣିବା :

- * ୧ କେଜି ବିହନ ପାଇଁ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ରିଡୋମିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ।
- * ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ।
- * ମଞ୍ଜିରୁ ମଞ୍ଜି ଏକ ଅଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ଧାତିରୁ ଧାତି ଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁଳିର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମଞ୍ଜି ପକାନ୍ତୁ ।
- * ମଞ୍ଜି ପକାଇବା ପରେ ଧାତି ଗୁଡିକୁ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତ ଗୁଣ୍ଡରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ଏହାପରେ ତଳି ପଟିକୁ ପୁଆଳ/ କୁଟା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏପରି କଲେ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରଣ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ।
- * ୫ ଗ୍ରାମ୍ ରିଡୋମିଲ୍‌କୁ ୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତଳିପଟି ଉପରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
- * ତିନି ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଆଳ/ କୁଟାକୁ ତଳି ପଟିରୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ପ୍ରୋ - ଟ୍ରେ ନିର୍ମାଣ:


- ➔ ୧୦ ଡେସିମିଲି ଜମିରେ ତଳି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ୧୦ଟି ପ୍ରୋ ଟ୍ରେ ଦରକାର ।
- ➔ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ ୯୮ଟି କୋଠରୀ ଥାଏ ।

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ :

- * କୋକୋପିଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ ୮ କିଲୋ
- * ଜିଆ ଖତ ୮ କିଲୋ
- * ନିମ୍ବ ପିଡିଆ- ୧ କିଲୋ
- * ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍ - ୫୦ ଗ୍ରାମ୍
- * ଫସଫୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ- ୫୦ ଗ୍ରାମ୍

ଉପରୋକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ପ୍ରୋ- ଟ୍ରେକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

କୋକୋ ପିଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ରଖନ୍ତୁ । ପରଦିନ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଶୁଖାଇ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।



ତଳିପଟିର ସୁରକ୍ଷା

- * ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଠାରୁ ।
- * ରୋଗ ଯୋକ ସଂକ୍ରମଣ ଠାରୁ ।



- * ତଳି ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କୋମଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ରୋଗ ଓ ଯୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ।
- * ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ (ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଟା) ପକ୍ଷୀ (କୁକୁଡ଼ା, ବତକ) ଆଦି ତଳିର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି ।
- * ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଳି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତଳି ପଟିର ସୁରକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ପୋ - ଟେ ନିର୍ମାଣ

ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ କରି
ମଞ୍ଜି ପକାନ୍ତୁ



ଏହା ପରେ ଝରା ସାହାଯ୍ୟର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ
ଜଳସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।



ପୋ-ଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଲାଭ

- * କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ।
- * ଅଳ୍ପରକ୍ଷା ଠିକ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ ।
- * ଡଳିକୁ ଟ୍ରେରୁ ସହଜରେ ବାହାର କରି ହୁଏ ।
- * ପ୍ରୋ ଟ୍ରେରେ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଜି ଅଳ୍ପରିତ ହୋଇଥାଏ ।
- * ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନକୁ ନେବା ଆଣିବା ସହଜ ହୁଏ ।
- * ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେକୁ କେଉଁଠି ବି ରଖା ଯାଇପାରେ ।



ପନିପରିବା ଓଳି ପରିଚାଳନା

ମାଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ୧୫ ଦିନପରେ

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

* ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ ମି.ଲି. ମହୁଲାସ୍ତ୍ର ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ।

* ଭୂତାଣୁଜନିତ ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ରୋଗର ବାହକ ଫଳ ମାଛିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମଶାରୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।


* ୩ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦ ମି.ଲି ମହୁଲାସ୍ତ୍ର ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ।

* ୧୦୦ ମି.ଲି ଦହିକୁ ୩ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

* ମୂଳ ସଡ଼ା ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରିଡ଼ୋମିଲ୍ ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ।

* ବୀଜାଣୁଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ପାଇଁ ସ୍ପେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ।





ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିର ବାଇଗଣ ଚାଷ




ବାଇଗଣ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

- ★ ବାଇଗଣ ଶୁଷ୍କ ଜମିରେ କମ୍ ଜଳସେଚନରେ ବର୍ଷସାରା ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
- ★ ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ବାଇଗଣ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ।
- ★ ଭାରତର ବାଇଗଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବିହାର ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ।

ବାଇଗଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ :

ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୫ରୁ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ୧୪୦୦ଏମ୍.ଏମ୍ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ।

ତାପମାତ୍ରା	ଜଳ	ବୃଣିବା ତାପମାତ୍ରା	ଅମଳ ତାପମାତ୍ରା
			
୧୫-୩୮ ଡିଗ୍ରୀ C	୧୪୦୦ ମି.ଲି	୧୫-୨୦ ଡିଗ୍ରୀ C	୩୦-୩୨ ଡିଗ୍ରୀ C

ଉପଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ତିକା :

- ★ ବାଇଗଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ★ ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟର ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଗିଡ଼ା ଦୋରସା, ଦୋରସା ପଚୁ ମାଟି, ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।
- ★ ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ମାଟିର ଅମ୍ଳାୟତା ୫.୫ରୁ ୬.୬ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କିସମ

ତାରିଣୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଭା, ସନ୍-ଗ୍ରୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍-୦୩୮, ଅକ୍ତିତା, ଜେକେ-୮୦୩୧, ସେମିନିସ୍- ମଞ୍ଜରି, ଚକ୍ର ସିନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା, ବିବି-୪୪, ବିବି-୧୧, ଭି.ଏନ୍.ଆର୍-୬୦, ସନ୍-ଗ୍ରୋ -୧୩୨ ।



ବାଇଗଣ (ଚାଉ ରୋପଣ)

- ★ ୧୦ ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ଗ୍ରାମ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ।
- ★ ୧୦ ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ୫-୧୦ କିଗ୍ରା ନିମ୍ନ ପିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ି ୨.୫ ଫୁଟ ଏବଂ ଚାରାରୁ ଚାରା ୨.୫ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ ।
- ★ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାତରେ ୧ କିଲୋ ଗୋବର ଖତ, ୧ ଗ୍ରାମ ଫୋରେଟ୍ ପକାଇ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



- ★ ତଳିକୁ ସିଧାରଖି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲଭାବେ ମୂଳର ମାଟିକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଉ ମୂଳଟି ଖାଲୁଆ ରହି ପାଣି ଜମିବ ନାହିଁ ।
- ★ ଚାଉ ରୋପଣ ସମୟରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଚାଉ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।

ଚାରା ରୋପଣର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

ରାସାୟନିକ ସାର ପରିଚାଳନା

- ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ (୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ଡି.ଏ.ପି.+ ୭୫ ଗ୍ରାମ୍ ଏସ୍. ଏସ୍. ପି.କୁ ୨ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ)
- ମିଶିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ୧୩ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରତି ଗଛର ମୂଳରେ ଗୋଟେ କପ୍ (୨୦୦ ମି.ଲି, ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଲଗାଇବା ପରଠାରୁ ଦିନେ ଛଡା ଦିନେ ଷ୍ଟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ୨-୩ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ଚାରାରୋପଣର ୧୧ରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

- କୋଡାଖୋସା ସମୟରେ ପ୍ରତି ଗଛ ପିଛା ୪୦ରୁ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରାଣାମୃତ ଏବଂ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ଜିଆଖତକୁ ୪ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ରିଙ୍ଗ୍ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ମାଟି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ । କୀଟନାଶକ ଭାବେ ନିମାସ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପୋଟାସ୍ ମିଳିଥାଏ ।



ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

- ଡି.ଏ.ପି. ୬ କିଲୋ, ପଟାସ୍ ୬ କିଲୋ ଏବଂ ସ୍ପୁରିଆ ୬ କିଲୋକୁ ମିଶାଇ ଗଛ ଠାରୁ ୬ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ୍ଡାରା ୪ ଗ୍ରାମ୍, ରିଡୋମିଲ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଧାନୁଭିର୍ ୪ ମି.ଲି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ତେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।



ଚାରା ରୋପଣର ୨୫ରୁ ୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

ଚାରାରୋପଣର ୨୨-୨୫ ଦିନରେ: ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ନହେବା ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି ଦହି (ମଠାସ) କୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସ୍ତେ କରିବେ, ଯେପରି ମନ୍ଦାର ମାଟି ଅଂଶ ୧ ଇଞ୍ଚ ଓଦା ରହିବ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

- ★ ଏକଡାରା ୪ ଗ୍ରାମ, ସାପ୍ ୨୦ ଗ୍ରାମ, ଧାନୁଭିର୍ ୪ ଏମ୍.ଏଲ୍, ୨୦୦ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ପୁରିୟା ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ପ୍ରଥମ ସ୍ତେର ୨ ଦିନ ପରେ କ୍ରୋସିନ୍ ଏ.ଜି ୧ ଗ୍ରାମ୍, ୨ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଡି.ଏ.ପି. ୪ କିଲୋ, ସ୍ପୁରିଆ ୪ କିଲୋକୁ ମିଶାଇ ଗଛର ୧୦ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ମାଟି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ ।



ଚାରା ରୋପଣର ୩୫-୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା

- * ଚାରା ରୋପଣର ୩୫ ଦିନରେ : କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଫଳବିନ୍ଧାରୁ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି, ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ ଗୋଳାଇ ଫସଲରେ ସ୍ତେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- * ସମୟ ସମୟରେ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡି ଝଡିଯାଏ, ଝାଉଁଳି ଯାଏ, ଏହି ଫିମି ଜନିତ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ରୁ ୪ ମି.ଲି, ହିସାବରେ ମହୁଲାସ୍ତ ଗୋଳାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- * ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ମି.ଲି. ଅମୃତ (ଖସା, ଗହମ, ଚଣା, ମୁଗ, ହରଡ଼, ରୁମା ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଗାଈ ଗୋବର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ) ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ଲାନୋଫିକୁ ୧ ମି.ଲି କୁ ୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ । ମାପିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟନ୍ ସିରିଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଧାନ ଦେବେ ଯେପରିକି ମାତ୍ରା ଅଧିକ ନ ହୁଏ, ନଚେତ ପୁରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।



ଚାରାରୋପଣର ୪୦ ଦିନରେ :	୨ୟ କୋଡାଖୋସା ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ- ★ ୧୦ ଡିସିମିଲ୍ ପ୍ରତି ୨୫ କିଗ୍ରା ପ୍ରାଣାମୃତ ଏବଂ ୨୦ କିଗ୍ରା ଜିଆଖତକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ★ ଗଛରେ କାଣ୍ଡ/ମୂଳସତ୍ତା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମହୁଲାସ୍ତ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩-୪ ମି.ଲି ଗୋଳାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୪୨ ଦିନରେ :	କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମିଲି ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ ଗୋଳାଇ ଫସଲରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୪୪ ଦିନରେ :	ଅମୃତ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୫୦ ଦିନରେ:	କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ ଗୋଳାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୫୫ ଦିନରେ:	ଅମୃତ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୬୧ ଦିନରେ:	ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

ବାଇଗଣରେ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଏବଂ ପୋକ

କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ:

କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ବାଇଗଣ ଫସଲର ସବୁଠୁ କ୍ଷତିକାରକ ପୋକ । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ପୋକଜନିତ କ୍ଷତି ବାଇଗଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ । କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧାପୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁକ (ଲାର୍ଭା) ଅବସ୍ଥାରେ ଫସଲରେ କ୍ଷତି କରେ । ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକଟି ପ୍ରାୟ ୧୫ ମି.ମି. ଲମ୍ବା । ଏହାର ଡେହାରେ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ଧାରରେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଝାଲର ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ । ଗାରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟେ । ସାଧାରଣତଃ ଭୋରରୁ ସକାଳ ୮ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେ । ସନ୍ତାନଜାତ ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ଚାରିଆଡ଼େ ଚଲାବୁଲା କରି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କଢ଼, ଫୁଲବୃତ୍ତ ଓ ଫଳର ବୃତ୍ତି କୋଣ ଇତ୍ୟାଦି ସନ୍ଧିସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି । ତା ପରେ ଶୁକ ଗଛର କଅଁଳିଆ ଶାଖା ବା ଡାଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଣାକରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ଭିତର ଅଂଶକୁ ଖାଇ ସୁତଙ୍ଗ ପରି କରିଦିଏ । ଫଳରେ କଅଁଳିଆ ଡାଳ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ ଓ ଶୁଖିଯାଏ । ସୁସ୍ଥ ଓ ନରମ ଅଗଡାଳ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବା ଏହି କୀଟ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ । ଫଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକ, ଫଳର ବୃତ୍ତି ତଳପାଖରେ ଛିଦ୍ରକରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ଭିତର ଅଂଶକୁ ଖାଇ ବଢ଼େ । ଏହା ଫଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁତଙ୍ଗ କରି ସେଥିରେ ରହେ ଓ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଏହା ପତ୍ର ବୃତ୍ତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ । ଏଣୁ ପତ୍ର ଝାଉଁଳିଯାଏ । କଢ଼ ଓ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ । ତା’ ପରେ ଶୁକଟି ବାହାରକୁ ଆସି ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରେଶମୀ ଖୋସା କରି ପ୍ୟୁପା ଅବସ୍ଥାରେ ୮-୧୦ ଦିନ ରହେ । ଏହାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗଟି ବାହାରିଯାଏ । ଜୀବନଚକ୍ର ୨୧-୪୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ।



ପ୍ରତିକାର

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

କୀଟନାଶକର ନାମ	ମାତ୍ରା
ହାଣ୍ଡିଖତ	୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦ ମି.ଲି
ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ	୫୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ମି.ଲି
ସଜା ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରା(ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍)୪-୦୬ ପ୍ରତି ଏକର	
ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ	ଏକର ପିଛା ୨ ରୁ ୩ ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମ । ଟିଲୋନିସ୍ ପ୍ରଜାତିର
ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରା	ଏକର ପିଛା ୨ ରୁ ୩ଟି



ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

କୀଟନାଶକର ନାମ	ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା
ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ ବିଷ (୧%)	୧-୧.୫ ଲିଟର
ସାଇପର୍ମେଥ୍ରିନ୍ ୧୦% ଇ.ସି.	୧୫୦-୪୦୦ମି. ଲି.
ଫେନ୍ଥାଲ୍‌ରେଟ୍ ୨୦% ଇ.ସି.	୩୭୫-୫୦୦ମି.ଲି.
ଲାଇଡା- ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ ୫% ଇ.ସି.	୪୦୦-୬୦୦ମି.ଲି.,
କ୍ଲିନାଲ୍‌ଫ୍ ୨୫% ଇ.ସି.	୧ ଲିଟର
ଥାଓଡିକାର୍ବ ୭୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି.	୫୦୦-୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ୍
ଟ୍ରାଇକୋଥାମ୍ ୪୦% ଇ.ସି.	୧ ଲିଟର



ବାଇଗଣର ଶୋଷକ କୀଟ



ଜଉପୋକ



ମିଲିବଗ



ନାଲିବୁଢ଼ିଆଣୀ



ଡିଆଁ ପୋକ ବା ହୋସ୍ତର



ଉପରୋକ୍ତ ଶୋଷକ କୀଟମାନେ ପତ୍ର ତଳେ, ପତ୍ରଶିରା ଆଦିରେ ରହି ରସ ଶୋଷିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ରଟି ଶୁଖିଯାଏ, ମୋଡ଼ିହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ବଜେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

ପ୍ରତିକାର

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

- ★ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗଛ କିମ୍ବା ଗଛର ଅଂଶକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ★ ବାଇଗଣ କ୍ଷେତରେ ଉଠିଥିବା ଘାସକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଶୋଷକ କୀଟ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ହାଣ୍ଡିଖତ ୩୦ ମି.ଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ପତ୍ରର ଉପର ଏବଂ ତଳପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ

- ★ ମିଥାଇଲ୍ ଡେମେଟନ୍ ୨୫ ଇସି ୧ ମି.ଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
କିମ୍ବା
ମାଲାଥ୍‌ୟନ୍ ୫୦ ଇସି ୨ ମି.ଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ବାଇଗଣର ସୁତ୍ର କୃମି

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

ରାସାୟନିକ

ଏହାର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଗଛର ଚେରରେ ଗ୍ରହଣି ବା ଗଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଫଳରେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ, ଉଚ୍ଚତା କମିଯାଏ, ଗଛଟି ମରିଯାଏ ଓ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଚାରା ରୋପଣର ୨୦ ଦିନପରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୫୦ କି.ଗ୍ରା. ନିମ୍ନ ପଡ଼ିଥା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ଏହାଦ୍ୱାରା ଫଳବିକ୍ଷା, ପତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ ସୁତ୍ରକୃମିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ । ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ । ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁତ୍ର କୃମି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରାଟିଆ ହଳ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରେ ସୁତ୍ର କୃମି ମାନେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏବଂ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରି ନଥାନ୍ତି ।

ଚାରା ରୋପଣର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨.୫ କିଲୋ କାର୍ବୋଥ୍ୟୁରାନ୍ - ୩ଜି ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ବାଇଗଣରେ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ

ଫିଫି ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ :

ଏହା ଏକ ମୃତ୍ତିକାଜାତ ରୋଗ ଯାହାର ସଂକ୍ରମଣରେ ପତ୍ର ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ପତ୍ର ଝାଉଁଳି ଯାଏ, ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ କ୍ରମଶଃ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଝଡ଼ିପଡ଼େ ।



ଫିଫିଜନିତ ପତ୍ର ଦାଗ :

ପତ୍ରରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ଦାଗଟି କ୍ରମଶଃ ବଡ଼ହୋଇ ପତ୍ରରେ ମାଡ଼ିଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପତ୍ରଟି ଝଡ଼ିପଡ଼େ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅମଳ ବହୁମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସପାଏ ।




ଫିଫିଜନିତ ଫଳ ପତା ରୋଗ : ଏହା ଏକ ବିହ୍ୱନଜାତ ରୋଗ ଅଟେ । ସଂକ୍ରମିତ ଗଛଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାପି ଥାଏ । ବିହ୍ୱନ ବିଶୋଧନ ନ କରି ତଳି ପକାଇଲେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ।

ପ୍ରତିକାର

- ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ୫୦ ରୁ ୬୦ ମି.ଲି ମହୁଲାସ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।
- ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଫିମ୍ପିଜନିତ ରୋଗ ସହନୀୟ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ଗାଈ ପରିଶ୍ରାରେ କିମ୍ବା ବିଜାମୃତରେ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ଫିମ୍ପିଜନିତ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ

- ପତ୍ର ଉପରେ ଧଳାଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଧଳା ଆବରଣ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ।
- ଏହା ଏକ ଫିମ୍ପି ଯାହା ଉଭୟ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ିପାରେ ।
- ଏହା ପତ୍ରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯାଏ ।
- ପତ୍ର କ୍ରମଶଃ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଝଡ଼ିପଡ଼େ ଏବଂ ଅମଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ ।



ମୂଳସଡ଼ା ରୋଗ :

- ମୂଳଟି ସଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଗଛଟି ଝାଉଁଳିଯାଇ ମରିଯାଏ ।

ପ୍ରତିକାର

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

- ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରାନ୍ତପତ୍ର କୁ ଗଛରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ମୂଳସଡ଼ା ହେଲେ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖେତ ଚାରିପାଖ ଏବଂ ଗଛମୂଳ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ।
- ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଫିମ୍ପିଜନିତ ରୋଗ ସହନୀୟ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ୫୦ ରୁ ୬୦ ମି.ଲି ମହୁଲାସ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।
- ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ଗୋମୂତ୍ର ବା ବିଜାମୃତ ଏବଂ ଜୀବାଣୁସାରରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

- ୧୦ ଗ୍ରାମ ରିଡ଼ୋମିଲ୍ କୁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ କୋବି ଚାଷ



କୋବି ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

କୋବି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ:

ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଦିନରେ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ଶୀତଳ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁରେ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତି କମ୍ ବା ଅତି ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ତାପ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଗଛ ବଢୁଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତାପ ବଢିଗଲେ ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଏହି ଚାଷ ବର୍ଷାରତ୍ନରେ ନିଗଡ଼ା ଜମିରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।

ଉପଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ତିକା:

- ★ ନିଗିଡ଼ା, ଉର୍ବର, ଦୋରସା ମାଟି ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।
- ★ ମାଟିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଲେ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିରେ ଫୁଲକୋବି ଭଲ ହୁଏନାହିଁ ।
- ★ ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ମାଟିର ଅମ୍ଳୀୟତା ୫.୫ ରୁ ୬.୬ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବିହନ:

- ★ ୧୦ ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ପାଇଁ ୨୦ ଗ୍ରାମ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ।

ବିହନ ବିଶୋଧନ:

- ★ ବିହନକୁ ବିଜାମୃତରେ ପକାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ।
- ★ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା- ଭିରିଡ଼େ ଅଧା ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ସୁଡୋମୋନାସ୍ ଫ୍ଲୁରୋସେନ୍ସ ୧ ଗ୍ରାମ୍ରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ବିହନରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍‌କୁ ଯେଜରେ ମିଶାଇ ବିହନକୁ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ।



ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କିସମ

ଫୁଲକୋବି

କିସମ	ଉନ୍ନତ	ଶଙ୍କର
ସଥଳ (୨୦-୨୫ଦିନ)	ପୁଷା ଆର୍ଲିସିନେଟିକ, କାର୍ଡିକା, ଆର୍ଲି କୁଆଁରୀ, ପୁଷା ଦୀପାଳୀ	ଶ୍ୱେତା, ପୁଷ୍ପଗିରି, ତୁଷାର, ଗୁଡ଼ମ୍ୟାନ
ମଧ୍ୟମ (୨୫-୩୦ଦିନ)	ମାର୍ଗଶିରା, ପୁଷ ଶାରଦା, ପୁଷା କଟକୀ, ଅପରାଜିତା,	ପୁଷା ହାଇବୀଡ-୨, ଆମାଜିଙ୍ଗ, ମହିମା
ବିଳମ୍ବ (୩୦ଦିନରୁ ଅଧିକ)	ପୁଷା ଶୁଭଦ୍ରା, ପୁଷା ସିନେଟିକ, ପୁଷା ସ୍ପୋବଲ-୧, ସ୍ପୋବଲ-୧୨,	ଲେଟମ୍ୟାନ, ରିମା, କିବୋ ଜିଆଣ୍ଡ

କମ୍ପାନୀ	ପ୍ରକାର (ସଥଳ)	ମଧ୍ୟମ	ବିଳମ୍ବ
ନୁଜୀବୀଡୁ	୨୫୦	-	-
ନୋବେଲ୍	ସ୍ପୁଟି	୨୫୧	-
ସେମିନିସ୍	୧୪୫୧	ମେଘା	ବରଖା
ନାମଧାରୀ	୧୪୪୮	୨୦ଏନ୍.	୧୦୨
ଶାକତା	ମବଲ	କଣ୍ଢେସା	ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲୁସ୍
ସିଞ୍ଚେଣ୍ଡା	୧୫୨୨	ସ୍ପୋ ହ୍ୱାଇଟ୍	

ବନ୍ଧାକୋବି

କିସମ	ଉନ୍ନତ	ଶଙ୍କର
ସଥଳ (୨୦-୨୫ ଦିନ)	ଗୋଲେଡେନ ଏକର, ପ୍ରାଇଭ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପୁଷା ସମ୍ବନ୍ଧ	ଗ୍ରୀନବଲ, ପ୍ରିୟା, ଜେନିଥ ଗୋଲ୍ଡଷ୍ଟାର, ପ୍ରଗତି
ମଧ୍ୟମ (୨୫-୩୦ ଦିନ)	ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ଇକ୍ୟୁଜିହାନ, କୋପେନ ହେଗେନ ମାର୍କେଟ	ଉନ୍ନତି ଗୀନସପ୍ରାଟ, ଗାଇଭ୍ ଅନ୍, ରମତା
ବିଳମ୍ବ (୩୦-୧୨୦ଦିନ)	ପୁଷା ବ୍ରମ୍ ହେଡ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର	ଫିଲ୍ଡ, ରକେଟ, ବୀଜୋ ଶୀତଳ ୩୨ ପ୍ରାଇମେରୋ ରେଷଡ ବେବି, ଇଣ୍ଡିଗୋ

କମ୍ପାନୀ	ପ୍ରକାର (ସଥଳ)	ମାଧ୍ୟମ	ବିଳମ୍ବ
ନାମଧାରୀ	ଏନ୍.ଏସ୍-୪୩		
ଟୋକିଟା	ବୁଜାୟା	ହରେ କ୍ରୀଷ୍ଣା	
ସେଣ୍ଟୁରୀ	-	-	କୋଶାକି
ସେମିନିସ	-	-	ଇନ୍ଦୁ

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାରା ରୋପଣ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ

- ★ ଫୁଲକୋବି ପାଇଁ ଜମି ଭଲ ଭାବେ ହଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ★ ୨-୩ ଥର ହଳ କରି ଭଲ ଭାବରେ ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଶେଷଓଡ଼ ହଳ ବେଳେ ଏକର ପିଛା ୧୦-୧୨ ଗାଡ଼ି ସଜା ଗୋବରଖତ ବିଲରେ ଦେଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ★ ସଥଳ କିସମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଧାତି ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ୪୫ ସେ.ମି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ବ୍ୟବଧାନ ୩୦ ସେ.ମି, ମଧ୍ୟମ କିସମ ପାଇଁ ଗଛକୁ ଗଛ ଓ ଧାତିକୁ ଧାତି ୪୫ ସେ.ମି ଓ ବିଲମ୍ବ କିସମ ପାଇଁ ଧାତିକୁ ଧାତି ୬୦ ସେ.ମି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୬୦ ସେ.ମି ରଖି ତଳି ରୁଅନ୍ତୁ ।
- ★ ତଳି ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ କିଲୋ ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସଫେଟ୍ ଓ ୪୦ କିଲୋ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ସାର ଦେଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ★ ସାଧାରଣତଃ ଉପରବେଳା ତଳି ଉପାତି ବିଲରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ଲଗାଇବାର ୧ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକର ପିଛା ୪୪ କିଲୋ ଯୁରିଆ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ★ ରୋଇବାର ୩୦ ଦିନ ପରେ ପୁଣିଥରେ କୋଡାଖୋସା ସମୟରେ ପ୍ରତି ଗଛ ପିଛା ୪୦ରୁ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରାଣାମୃତ ଏବଂ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ଜିଆଖତକୁ ୪ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ରିଙ୍ଗ୍ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଏକର ପିଛା ୪୪ କିଲୋ ଯୁରିଆ ଦେଇ ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ★ ଶେଷଥର ଏକର ପିଛା ୪୪ କିଲୋ ଯୁରିଆ ସାର, ଲଗାଇବାର ୪୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଏହାଦ୍ୱାରା କଢ଼ ଶିଳ୍ପ ବାହାରିବ ଓ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବ ।



ମୁଖ୍ୟରୋଗ

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

ମୂଳସଜା ରୋଗ: ଏହା ଏକ ମାଟି ଜାତ ରୋଗ । ଏହାଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଡର ମୂଳଭାଗ ସଜିଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ, ଯାହାକି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇଲେ ବଢିଥାଏ ।

ଲକ୍ଷଣ: ମୂଳ ସଜିଯାଏ ଏବଂ ଗଛଟି ମୂଳରୁ ଭାଙ୍ଗିପଡେ ।



ପ୍ରତିକାର :

- ★ ଖରାଟିଆ ହଳ ସମୟରେ ସଜା ଗୋବର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହି ରୋଗ କମି ଯାଇଥାଏ ।
- ★ ପାଣି ନ ଜମିଲେ ଏହି ରୋଗ କମି ଯାଇଥାଏ ।
- ★ ଯେଉଁ ଗଛ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ମାଟି ସହ ଉପାଡି ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ପକାନ୍ତୁ ।
- ★ ଏହି ରୋଗରେ ସଠାସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଲାଭଦାୟକ ।

ସଠାସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:

୨ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଶୁଣ୍ଠି ପକାଇ ତୁଲିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଯେପରି ୧ ଲିଟର ପାଣି ବଳକା ରହିବ । ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ୨ରୁ ୩ ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସରକୁ କାଢି ପୂର୍ବ ମିଶ୍ରଣରେ ମିଶାନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

ମୂଳସଜା ଯଦି ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ହୁଏ (୨ ଗ୍ରାମ୍ ରିଡୋମିଲ୍ ଗୋଲ୍) + (୧ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଡୋମାଇସିନ୍) କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।



ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଫଳପତା ହେଲେ:

- ★ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜମିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋବିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଫସଲ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ବର୍ଷାଦିନେ ଫସଲ କରୁଥିଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।

ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ବା ପାଉଁସରୀ ମିଳିତ୍ୟୁ :

- ★ ପତ୍ର ଉପରେ ଧଳା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଧଳା ଆବରଣ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ।
- ★ ଏହା ଏକ ଫିଙ୍ଗି ଯାହା ଉଭୟ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ିପାରେ ।
- ★ ଏହା ପତ୍ରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ ।
- ★ ପତ୍ର କ୍ରମଶଃ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଝଡ଼ିପଡ଼େ ଏବଂ ଅମଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରତିକାର:

- ★ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଗଛରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ★ ମୂଳସଜା ହେଲେ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ★ ଖେତ ଚାରିପାଖ ଏବଂ ଗଛମୂଳ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ।
- ★ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗିଜନିତ ରୋଗ ସହନୀୟ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ★ ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ମି.ଲି ମହୁଲାସ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ଗାଈ ପରିଶ୍ରା କିମ୍ବା ବିଜାମୃତ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।



ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରିଡୋମିଲ୍‌କୁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ମୁଖ୍ୟକୀଟ

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା



ଏହି ପୋକ ନଲାଗିବା ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦ ମି.ଲି. ହାଣ୍ଡିଖତ ଏବଂ ୫୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ମି.ଲି. ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଅଦଳ ବଦଳ କରି ୧୦ରୁ ୧୨ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ସ୍ତେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

କୀଟନାଶକର ନାମ	ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ହାର
ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ ବିଷ (୧%)	୧-୧.୫ ଲିଟର
ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ୧୦% ଇ.ସି.	୧୫୦-୪୦୦ ମି.ଲି.
ଫେନଥାଲରେଟ୍ ୨୦% ଇ.ସି.	୩୭୫-୫୦୦ ମି.ଲି.
ଲାମ୍ବଡା- ସାଇହାଲୋଥ୍ରନ୍ ୫% ଇ.ସି.	୪୦୦-୬୦୦ ମି.ଲି.
କ୍ଲିନାଲଫସ୍ ୨୫% ଇ.ସି.	୧ ଲିଟର
ଥାଓଡିକାର୍ବ ୭୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି.	୫୦୦-୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ୍
ଟ୍ରାୟାଜୋଫସ୍ ୪୦% ଇ.ସି.	୧ ଲିଟର

ଉତ୍କଳ ପକ୍ଷୀରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ




ଲଙ୍କା ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

- ★ ଲଙ୍କା ଏକ ଶକ୍ତ ଫସଲ ଯାହାକି ଶୁଷ୍କ ଜମିରେ କମ୍ ଜଳସେଚନରେ ହୋଇଥାଏ ।
- ★ ଏହାକୁ ବର୍ଷସାରା କରାଯାଇପାରିବ । ଭାରତର ଲଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ।

ଲଙ୍କାଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ :

ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୫ରୁ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ର ଏବଂ ୧୨୦୦ ଏମ୍.ଏମ୍ ବର୍ଷା ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍କାଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ।

ତାପମାତ୍ରା	ଜଳ	ବିହନ ବୁଣିବା ତାପମାତ୍ରା	ଅମଳ ତାପମାତ୍ରା
			
୧୫-୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍	୬୦୦- ୧୦୦୦ ଏମ୍. ଏମ୍.	୧୫-୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍	୩୦-୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍

ଉପଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ତିକା:

- ★ ଲଙ୍କା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ★ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଗିଡା ଦୋରସା, ଦୋରସା ପଟୁମାଟି, ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।
- ★ ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ମାଟିର ଅମ୍ଳାୟତା ୬.୫ ରୁ ୭.୫ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କିସମ



୧. ନନ୍ ହେମସ୍ **US** -୩୪୧

୨. ମାହିକୋ- ଡେଜସ୍ୱାନି

୩. ସେମିନିସ୍- ସିଆମ୍ ହଟ୍

୪. ସେମିନିସ୍ - ଉତ୍ତଳ

୫. ଭି.ଏନ୍. ଆର୍- ୧୪୫

୬. ସ୍ଥାନୀୟ କିସମ (ବାମଡା)

ଲଙ୍କା ଚାରା ରୋପଣ

- ★ ୧୦ ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାପାଇଁ ୧୫ ଗ୍ରାମ ବିହନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ।
- ★ ୧୦ ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ୧୦୦୦ ଗଛ ଲାଗଇବାକୁ ୫-୧୦ କିଗ୍ରା ନିମ୍ନ ପିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ି ୨ ଫୁଟ ଏବଂ ଚାରାରୁ ଚାରା ୧.୫ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ ।
- ★ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାତରେ ୧ କିଲୋ ଗୋବର ଖତ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ଫୋରେଟ୍ ପକାଇ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



- ★ ତଳିକୁ ସିଧା ରଖି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ମାଟିକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାରା ମୂଳଟି ଖାଲୁଆରହି ପାଣି ଜମିବ ନାହିଁ ।

- ★ ଚାରା ରୋପଣ ସମୟରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଚାରା ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।



- ★ ଚାରା ରୋପଣ ପରେ, ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଚାରା ରୋପଣର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

- ★ ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଷ୍ଟାର ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ (୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ଡି.ଏ.ପି. + ୭୫ ଗ୍ରାମ୍ ଏସ୍. ଏସ୍. ପି.କୁ ୨ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ)
- ମିଶିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ୧୩ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରତି ଗଛର ମୂଳରେ ଗୋଟେ କପ୍ (୨୦୦ମି.ଲି.) ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ★ ଲଗାଇବା ପରଠାରୁ ଦିନେ ଛଡା ଦିନେ ଷ୍ଟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ୨-୩ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ଚାରାରୋପଣର ୧୧ରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

- ★ କୋଡାଖୋସା ସମୟରେ ପ୍ରତି ଗଛ ପିଛା ୪୦ରୁ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରାଣାମୃତ ଏବଂ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ଜିଆ ଖତକୁ ୪ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ରିଙ୍ଗ୍ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

- ★ ମାଟି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ ।

- ★ ଡି.ଏ.ପି. ୬ କିଲୋ ପଟାସ୍ ୬ କିଲୋ ଏବଂ ଯୁରିଆ ୪ କିଲୋକୁ ମିଶାଇ ଗଛ ଠାରୁ ୬ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

- ★ ଏକ୍ଡାରା ୪ ଗ୍ରାମ୍, ରିଡୋମିଲ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଧାନୁଭିର୍ ୪ ମି.ଲି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।



ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

ଚାରା ରୋପଣର ୨୫ରୁ ୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

- ଚାରା ରୋପଣର ୨୨-୨୫ ଦିନରେ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ନ ହେବା ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି ଦହି (ମଠାସ୍ତ) କୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସ୍ତେ କରିବେ, ଯେପରି ମନ୍ଦାର ମାଟି ୧ ଇଞ୍ଚ ଓଦା ରହିବ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

- ଏକଡାରା ୪ ଗ୍ରାମ୍, ସାପ୍ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍, ଧାନୁଭିର୍ ୪ ମି.ଲି, ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଯୁରିଆ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରଥମ ସ୍ତେର ୨ ଦିନ ପରେ କ୍ଲୋସିନ୍ ଏଜି ୧ ଗ୍ରାମ୍, ୨ ଲିଟର ପାଟିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଡି.ଏ.ପି. ୪ କିଲୋ ଏବଂ ଯୁରିଆ ୪ କିଲୋକୁ ମିଶାଇ ଗଛର ୧୦ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ମାଟି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ ।



ଚାରା ରୋପଣର ୩୫-୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

- ★ ଚାରା ରୋପଣର ୩୫ ଦିନରେ : କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି. ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଗୋଳାଇ ଫସଲରେ ସ୍ତେଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ★ ସମୟ ସମୟରେ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡି ଝଡିଯାଏ, ଝାଉଁଳି ଯାଏ । ଏହା ଏକ ଫିଫିଜନିତ ରୋଗ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ରୁ ୪ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ମହୁଲାସ୍ତ୍ର ଗୋଳାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ ରୁ ୦ ମି.ଲି ଅମୃତର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

- ★ ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ ୧ ମି.ଲି.କୁ ୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ମାପିବା ପାଇଁ ସିରିଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଧାନ ଦେବେ ଯେପରି ମାତ୍ରା ଅଧିକ ନହୁଏ, ନଚେତ୍ ପୁରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।



ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

୨ୟ କୋଡାଖୋସା ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

- ★ ୧୦ ଡିସିମିଲ୍ ପାଇଁ, ୨୫ କି.ଗ୍ରା ପ୍ରାଣାମୃତ ଏବଂ ୨୦ କି.ଗ୍ରା ଜିଆ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୋଡା ଖୋସା କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଗଛରେ କାଣ୍ଡ/ ମୂଳସଜା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମହୁଲାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଲିଟର

ଚାରା ରୋପଣର ୪୦ ଦିନରେ	:ପାଣିରେ ୩-୪ ମି.ଲି. ଗୋଳାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୪୨ ଦିନରେ	:କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି. ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଗୋଳାଇ ଫସଲରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୪୪ ଦିନରେ	: ଅମୃତ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୫୦ ଦିନରେ	: କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି. ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଗୋଳାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୫୫ ଦିନରେ	: ଅମୃତ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୬୧ ଦିନରେ	: ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ଲଙ୍କାରେ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଏବଂ ପୋକ

ଫଳବିକ୍ଷା ପୋକ:

ଫଳବିକ୍ଷା ପୋକ ଲଙ୍କା ଫସଲର ସବୁଠୁ କ୍ଷତିକାରକ ପୋକ । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଲଙ୍କା ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ଏହି ପୋକର ଅଧିକ ପ୍ରକୋପ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।

- ★ ବୟସ୍କ ପ୍ରଜାପତିଟି V ଆକାର ଦେଖାଯାଏ ।
- ★ ରଙ୍ଗ - ଫିକା ବାଦାମୀ ହୋଇଥାଏ ।
- ★ ତେଣା ଶେଷରେ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ / ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ । ଅଣ୍ଟାଟି ଗୋଲାକାର ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ।



ପ୍ରତିକାର

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

କୀଟନାଶକର ନାମ	ମାତ୍ରା
ହାଣ୍ଡିଖତ	୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦ ମି.ଲି,
ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ	୫୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ମି.ଲି.
ସଜା ଆକର୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର	୪-୬ ପ୍ରତି ଏକର
ଚ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ	ଏକର ପିଛା ୨ ରୁ ୩ ଗ୍ରାମ ଚ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମ୍ ।
	ଇଲୋନିସ୍ ପ୍ରଜାତିର
ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର	ଏକର ପିଛା ୨ ରୁ ୩ଟି



ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

କୀଟନାଶକର ନାମ	ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା
ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ ବିଷ (୧%)	୧-୧.୫ ମି.ଲି
ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ୧୦% ଇ.ସି. ।	୧୫୦-୪୦୦ ମି.ଲି.
ଫେନ୍‌ଡାଲ୍‌ରେଟ୍ ୨୦% ଇ.ସି.	୩୭୫-୫୦୦ ମି.ଲି
ଲାମ୍ବଡା- ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ ୫% ଇ.ସି.	୪୦୦-୬୦୦ ମି.ଲି
କ୍ଲିନାଲ୍‌ଫସ୍ ୨୫% ଇ.ସି.	୧ ଲିଟର
ଥାଉଡିକାର୍ବ ୭୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି.	୫୦୦-୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ୍
ଚ୍ରାଇକୋଫସ୍ ୪୦% ଇ.ସି.	୧ ଲିଟର



ଲଙ୍କାରେ ଶୋଷକ କୀଟ

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

- ★ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗଛ କିମ୍ବା ଗଛର ଅଂଶକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ★ କ୍ଷେତରେ ଉଠିଥିବା ଘାସକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ★ ଶୋଷକ କୀଟ ନିଆସିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ହାଣ୍ଡିଖତ ୩୦ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଭଲଭାବେ ପତ୍ରର ଉପର ଏବଂ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ★ ନିୟତେ ୨ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

- ★ ମିଥାଇଲ୍ ଡେମେଟୋନ୍ ୨୫ ଇ.ସି ଏ ମି.ଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
- କିମ୍ବା
- ★ ମଲାଥ୍ରିୟନ୍ ୫୦ ଇ.ସି ଏ ମି.ଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ମିଲିବର୍



ଜଉପୋକ



ଡିଆଁ ପୋକ



ନାଲିବୁଢ଼ିଆଣୀ



ଉପରୋକ୍ତ ଶୋଷକକୀଟ ମାନେ ପତ୍ର ତଳେ, ପତ୍ରଶିରା ଆଦିରେ ରହି ରସ ଶୋଷିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ରଟି ଶୁଖିଯାଏ, ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ବଢ଼େ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

ପତ୍ରକଟା ପୋକ

ପତ୍ର କଟା ପୋକ:

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ମି.ଲି. ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

୩ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।



ସୂତ୍ର କୃମି

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

ଏହାର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଏବଂ ଗଛର ଚେରରେ ଗ୍ରହଣ ବା ଗଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଫଳରେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ, ଉଚ୍ଚତା କମିଯାଏ । ରୁଗ୍‌ଗ ଗଛଟି ମରିଯାଏ ଓ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଏ ।

* ଚାରା ରୋପଣର ୨୦ ଦିନପରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୫୦ କି.ଗ୍ରା ନିୟମିତ ଆ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଫଳବିକ୍ଷା ପତ୍ର ସୁତଜା ଓ ସୂତ୍ରକୃମିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରେ ।

* ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।

* ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂତ୍ର କୃମି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ ।

* ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଖରାଟିଆ ହଳକରନ୍ତୁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ସୂତ୍ର କୃମି ମାନେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଂଶବିସ୍ତାର କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତି ।



ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

ଚାରାରୋପଣର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨.୫ କିଲୋ କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ଗାଈର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଲଙ୍କାରେ ହେଉଥିବା ରୋଗ

ଲଙ୍କାରେ ହେଉଥିବା ରୋଗ

ଫିଙ୍ଗିଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ:

ଏହା ଏକ ମୃତ୍ତିକାଜାତ ରୋଗ ଯାହାର ସଂକ୍ରମଣରେ :

- * ପତ୍ର ମୋଡି ହୋଇଯାଏ ।
- * ପତ୍ର ଝାଉଁଳି ଯାଏ ।
- * ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, କ୍ରମଶଃ ଶୁଖି ଯାଏ ଏବଂ ଝଡିପଡେ ।

ଫିଙ୍ଗିଜନିତ ପତ୍ର ଦାଗ:

- * ପତ୍ରରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ।
- * ଦାଗଟି କ୍ରମଶଃ ବଡ଼ହୋଇ ପତ୍ରରେ ମାଡିଯାଏ ।
- * ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପତ୍ରଟି ଝଡିପଡେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅମଳ ବହୁମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଏ ।

ଫିଙ୍ଗିଜନିତ ଫଳପତା ରୋଗ:

- * ଏହା ଏକ ବିହନଜାତ ରୋଗ ଅଟେ ।
- * ସଂକ୍ରମିତ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ ।
- * ବିହନ ବିଶୋଧନ ନ କରି ତଳି ପକାଇଲେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ।



ପ୍ରତିକାର

- * ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ୫୦ ରୁ ୬୦ ମି.ଲି. ମହୁଲାସ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।
- * ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗିଜନିତ ରୋଗ ସହନୀୟ ବିହନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- * ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ଗାଈ ପରିସ୍ରା କିମ୍ବା ବିଜାମୃତ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ଲଙ୍କାରେ ହେଉଥିବା ରୋଗ

ଫିଙ୍ଗିଜନିତ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ:

- * ପତ୍ର ଉପରେ ଧଳାଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଧଳା ଆବରଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
- * ଏହା ଏକ ଫିଙ୍ଗି ଯାହା ଉଭୟ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ିପାରେ ।
- * ଏହା ପତ୍ରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମଶଃ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଝଡ଼ିପଡ଼େ ଏବଂ ଅମଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ।



ମୂଳସଜା ରୋଗ:

- ମୂଳଟି ସଜି ଯାଏ,
କ୍ରମଶଃ ଗଛଟି ଝାଉଁଳି ଯାଇ ମରିଯାଏ ।

ପ୍ରତିକାର

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

- * ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଗଛରୁ ବାହାରକରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ମୂଳସଜା ହେଲେ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ଖେତ ଚାରି ପାଖ ଏବଂ ଗଛ ମୂଳ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ।
- * ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗି ଜନିତ ରୋଗ ସହନୀୟ ବିହନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- * ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ମି.ଲି ମହୁଲାସ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
- * ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ଗାଈ ପରିଶ୍ରାରେ କିମ୍ବା ବିଜାମୃତରେ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରିଡୋମିଲ୍‌କୁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ଲଙ୍କାରେ ହେଉଥିବା ରୋଗ

ବୀଜାଣୁଜନିତ ଝାଉଁଳା

ଗଛଟି ର ପତ୍ର ର ରଙ୍ଗ ନ ବଦଳି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହଠାତ ଝାଉଁଳି ଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଛ ଟି ମରିଯାଏ ।



ପ୍ରତିକାର

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

- * ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ଉପାଡ଼ି ଥିବା ଗଛକୁ ଖେତ ବାହାରେ ଗାତ କରି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- * କ୍ଷେତ ଚାରିପାଖ ଏବଂ ଗଛମୂଳ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ।
- * ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସହନୀୟ ବିହନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- * ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ୫୦ ରୁ ୬୦ ମି.ଲି ମହୁଲାସ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ କୁ ଗୋମୁତ୍ରରେ, କିମ୍ବା ବିଜାମୂତରେ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- * ଖରାଟି ହଳ ସମୟରେ ଜମିରେ ଚୂନ ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ଲତା ଜାତୀୟ ଚାଷ



ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ

ଝୁଡ଼ଙ୍ଗା : ବରଗୁଡ଼ି ବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ । ଏହା କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଚାଷ ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୨ରୁ ୧୪ କିଲୋ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗା ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଝୁଡ଼ଙ୍ଗା ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲଗାଯାଏ । ଲତା ଜାତୀୟ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରଞ୍ଜା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ବୁଦା କିସମ : ପୁଷା ଫସଲି, ପୁଷା ରତୁରାଜ, କାଶୀ କାଞ୍ଚନ, ଉତ୍କଳ ମାଣିକ, କାଶୀ ନିଧି, ପୁଷା କୋମଳ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗା - ୨୯୩, ପୁଷା ସୁକୋମଳ, ସିଞ୍ଜେଣ୍ଡା YB-7.

ଲତା କିସମ : ଅର୍କା ଗାରିମା, ଆମେରିକାନ ଲଙ୍କ, ଗ୍ରୀନ୍ ସାଗର, ମହାରାଣୀ ରେଡ ଶୋନା, କାଶୀ ସମୃଦ୍ଧି ।



ବୁଦା ଜାତୀୟ



ଲତା ଜାତୀୟ


ଉପଯୁକ୍ତ କିଷମ



ଜାକୃତି :

- * ମାଲିନୀ (ସେମିନିସ)
- * ରୋହିନି (ସେମିନିସ)
- * କିରଣ (ନନ୍ହେମ୍)
- * ଏନ୍ଏସ୍ - ୪୦୪ (ନାନ୍ଧାରୀ)
- * ସେରେନା (ମାହିକୋ)
- * କରିନା (ନ୍ୟୁଜିଭେଡୁ)
- * ମାହି ସଲ୍ଭିଆ (ମାହିକୋ)
- * କୁମୁଦ (ଭିଏନଆର)

ଉପଯୁକ୍ତ କିଷମ



କଲରା:

- * ନଭ୍‌ଧାନ୍
(ଭିଏନ୍‌ଆର)
- * ଆକାଶ
(ଭିଏନ୍‌ଆର)
- * ଭିଏନ୍‌ଆର-୨୨
- * ଅଭିଷେକ
(ସେମିନିସ୍)
- * ପାଲି (ଇଷ୍ ଥାଣ୍ଡ
ଝେଷ୍)
- * ଏନ୍‌ଏସ୍-୪୫୩
(ନାମ୍‌ଧାରୀ)

ଲଗାଇବା ସମୟ ଏବଂ ବିହନ ଉପଚାର

ବର୍ଷାଦିନେ

ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟ : ଜୁନ୍ ରୁ ଜୁଲାଇ

ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି : ନିଗିଡ଼ା, ଦୋରସା ମାଟି ଲତା ଜାତୀୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି : ୩ରୁ ୪ ଓଡ଼ ଗଭୀର ହଳ କରନ୍ତୁ ।

ବିହନ ଉପଚାର :

ବିହନ ବୁଣିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କିଲୋ ବିହନ ପାଇଁ ୪ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେନ୍‌ଡାଇଜିନ୍ କିମ୍ବା ଥିରାମ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରାଜକୋଡ଼ମାଓରିଡେ ୪ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ସୁଡୋମୋନାଶ ଫୁରୋସେନ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ ବିହନ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ।

ଜୀବାଣୁ ସାର ଦ୍ଵାରା ବିହନ ଉପଚାର:

ଏହା ସହିତ ୧ କିଲୋ ବିହନକୁ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଏବଂ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ପି.ଏସ୍.ବି. ମିଶାଇ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିମଧ୍ୟ ବିହନ ଉପଚାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ବୀଜ ର ଆବଶ୍ୟକତା: (୧୦ ଡେସିମିଲ୍ ଜମିପାଇଁ)

ଲାଉ - ୪୦ରୁ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ କାକୁଡ଼ି ୨୫ରୁ ୩୦ ଗ୍ରାମ୍, କଲରା ୧୦୦ରୁ ୧୨୦ ଗ୍ରାମ୍, ଜହ୍ନି ୭୦ରୁ ୯୦ ଗ୍ରାମ୍, ଝୁଡଙ୍ଗ ୭୦ରୁ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ

ବର୍ଷାଦିନିଆ ବୁଦା ଝୁଡଙ୍ଗ ଚାଷପାଇଁ ଗଛରୁ ଗଛ ୧୫-୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ି ୩୦-୪୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଲତା ଝୁଡଙ୍ଗଚାଷ ପାଇଁ ଗଛକୁ ଗଛ ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୬୦ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ମାପ ନେଇ ମନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଲାଉ ପାଇଁ ଗଛରୁ ଗଛ ୫ଫୁଟ ୬ ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ି ୫ ଫୁଟ ୬ ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ ।

ଅନ୍ୟ ଲତାଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଗଛରୁ ଗଛ ୩ ଫୁଟ ଏବଂ ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ି ୩ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବିହନ ଲଗାଇବା ସମୟରେ:

- * ଜମିକୁ ୨ ରୁ ୩ ଓଡ଼ ହଳ କରି ଏକର ପିଛା ୮ ରୁ ୧୦ ଟନ୍ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- * ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୪ ଫୁଟ ଏବଂ ଗଛରୁ ଗଛ ୧.୫ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ମନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- * ୧.୫ ଫୁଟ ଗଭୀର, ୧.୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ ୧.୫ ଫୁଟ ଓସାର ମନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- * ବିହନ ଲଗାଇବାର ୩ ରୁ ୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦା ଖୋଳନ୍ତୁ ।
- * ମନ୍ଦା ଖୋଳା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଧା ମାଟି ମନ୍ଦାର ବାମ କଡ଼େ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧା ମାଟିକୁ ମନ୍ଦାର ଡାହାଣପଟେ ରଖନ୍ତୁ ।
- * ୧ ଝୁଡ଼ି ଖତ, ୫ ଗ୍ରାମ୍ ନିମ୍ନ ପିଡ଼ିଆ ସହ ୩ଟି ମନ୍ଦାର ଦୁଇ କଡ଼େ ଥିବା ମାଟିସହ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ମନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ।
(ଏଥିରେ ୩ଟି ମନ୍ଦା ଭରା ଯାଇପାରିବ)
- * ମନ୍ଦାଟିକୁ ଉଚ୍ଚ କରି ଭରନ୍ତୁ ଯେପରି ଉଚ୍ଚତା ୬ ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ଜମି ରହିବନାହିଁ ।



ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ

ଲତାଜାତୀୟ ଫସଲରେ ପ୍ରଥମେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରେ ।

ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାରାଟି ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ଅଧିକ ଅମଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ପୋଲିଗ୍ରାସ୍‌ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କୋକୋପିଟ୍, ଗୋବର ଖତ, ଜିଆ ଖତର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ପରିମାଣ ୩:୨:୧ ରଖନ୍ତୁ ।



- * ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ପୋଲିଗ୍ରାସ୍‌ରେ ଭରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ମାଞ୍ଜି ପୋତନ୍ତୁ ।
- * ମାଞ୍ଜି ପୋତିଲା ପରେ ଜଳସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- * ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍କୁରଣ ହେବା ପାଇଁ ପଲିଥିନ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

୧୫ରୁ ୨୫ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।



ଖାଦ୍ୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ



ରୋପଣର ୧୦ରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

- * ପ୍ରଥମ କୋଡା ଖୋସା ସମୟରେ ମନ୍ଦା ଠାରୁ ୬ ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ରିଙ୍ଗ କରି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରାଣାମୃତ ଏବଂ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଜିଆଖତ ଦେଇ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।
- * ଜଳସେଚନ ସମୟରେ ଜୀବାମୃତର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ରୋପଣର ୨୦ରୁ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

- ୧୦ କିଲୋ ସବା ଗୋବର ଖତ ସହ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଅଜୋସ୍ଥିରିଲମ୍, ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଫସ୍‌ଫୋବ୍ୟାଙ୍କୁରିଆକୁ ଗୋଳାଇ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ରଖିଲା ପରେ ମନ୍ଦାରେ ରିଙ୍ଗ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- * ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଗୋବର ଖତ ଓଦାଳିଆ ଥୁବ ।
 - * ଲତାର ୫ରୁ ୬ ନମ୍ବର ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୬ ନମ୍ବର ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ନ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ୬ ନମ୍ବର ପତ୍ରରେ ଅଟକିଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ରୋପଣର ୨୫ ଦିନ ପରେ

ପ୍ରତିଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ରୁ ୪ ମି.ଲି. ଅମ୍ଳତ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ, ତାର ଏବଂ ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମତାନ ବା ମଞ୍ଚା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।

ରୋପଣର ୩୦ ଦିନ ପରେ

ପତ୍ରମୋଚା (ପତ୍ରଉକୁଣି, ଧଳା ମାଛି, ନାଲି ଜଉ) ଦେଖାଗଲେ ନିମାସର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ବିହନ ଲଗାଇବାର ୩୦ରୁ ୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର ୩୦-୩୫ ଦିନ ପରେ ଦୁଇଥର ମିଶ୍ରିତ ଅଣୁସାର (୩ ଗ୍ରାମ୍ / ଲିଟର) ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ

ବିହନ ଲଗାଇବାର ୪୦ରୁ ୫୦ ଦିନ ପରେ

ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩.୪ ମି.ଲି. ଅମ୍ଳତ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

ଫଳବିକ୍ଷା ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି, ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

ସାହାରା: କଲରା ଗଛ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାକୁ ସାହାରା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଲତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଦିନ ମାଟିରେ ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପୋକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେଣୁ ଭଲ ଅମଳ ଲାଗି ନିହାତି ଭାବେ ସାହାରା ଦିଅନ୍ତୁ ।






ଲତା ଜାତୀୟ ଫସଲରେ କୀଟ

ପତ୍ରକଟା ପୋକ (ଲିଫ୍ ମାଇନର)

୧ ଗ୍ରାମ୍ ଏକଡାରା ୩ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।



ଫଳ ମାଛି ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତି

ଫେରୋମୋନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।



ପତ୍ର କଟା ପୋକ

କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ଲତା ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ରୋଗ



ଫିଫି ଜନିତ ଫଳସଦା ରୋଗ

ବ୍ୟୁ -କୋପର ୩ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଡାକୋଲ ୩ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ରିଡୋମିଲ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେଇ କରନ୍ତୁ ।

ଝାଉଁଳା:

ବ୍ୟୁ କୋପର ୧୫ ଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ କ୍ରୋଶିନ ଏ.ଜି ୧ ଗ୍ରାମ୍ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେଇ କରନ୍ତୁ ।



ପାଉଡରୀ ମିଲଡିଡ (ପାଉଁଶିଆ)

ସାପ୍ କିମ୍ବା ସିକ୍ସ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେଇ କରନ୍ତୁ ।



ମୋସାଇକ୍

କୋନ୍ଫିଡର୍ ୧ ମି.ଲି., ୪ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେଇ କରନ୍ତୁ ।



ଉତ୍କଳ ପଞ୍ଚାବଳିରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ



ପ୍ରତିପରିବା ତଳି ପକାଇବା ବିଧି

ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ

ସାଧାରଣତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଭଲ ବର୍ଷା ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ତାପମାତ୍ରା (୧୮-୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେ.) ଏହି ଚାଷପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ । ଉଷ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଉଚ୍ଚ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ଭଲ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହାଇବ୍ରିଡ୍ କିସମ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହାକି ବର୍ଷାସାରା ଚାଷ କରିହେବ ।

ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଏବଂ ମାଟି

- * ଜମିଟି ଢିପ, ଗଡାଣିଆ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମା ହେଉ ନ ଥିବ ।
- * ଦୋରସା, ଦୋରସା ମଟାଳ ମାଟି ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ।
- * ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ ମାଟିର ଅମ୍ଳ ପି.ଏଚ୍ ୬.୨ ରୁ ୭.୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଭଲ ।



ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କିଛି ଉନ୍ନତ ଟମାଟୋ କିସମ

କିସମ	ସମୟ	ମୁଖ୍ୟଗୁଣ	ଅମଳ ଗଛ ପ୍ରତି
ନାମଧାରୀ 	ଜୁନ- ସେପ୍ଟେମ୍ବର	ଅମଳ ସମୟ - ୭୫ରୁ ୮୦ ଦିନ ଫଳର ଆକାର ୯୦-୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ବାଦ- ଖଟା ପାଖ ବଜାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସହନଶୀଳ	୭-୮ କିଲୋ
ସିଞ୍ଜେଣ୍ଡା-୧୭ 	ଜୁନ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର	ଅମଳ ସମୟ- ୮୦-୯୦ ଦିନ ଫଳର ଆକାର - ୬୦-୭୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦୂର ବଜାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ (ଶକ୍ତ ଫଳ ଏବଂ ସମାନ ରଙ୍ଗର) ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସହନଶୀଳ	୪ କିଲୋ
ରୋହିତ ୨ 	ଜୁନ- ସେପ୍ଟେମ୍ବର	ଅମଳ ସମୟ ୮୦-୯୦ ଦିନ ଫଳର ଆକାର ୮୦-୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦୂର ବଜାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ (ଶକ୍ତ ଫଳ ଏବଂ ସମାନ ରଙ୍ଗର) ଝାଉଁଳା ପତ୍ର ମୋଡ଼ାରୋଗ ସହନଶୀଳ	୭ କିଲୋ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏନ୍. ପି. 	ସେପ୍ଟେମ୍ବର -ନଭେମ୍ବର	ଅମଳ ସମୟ ୮୦-୧୦୦ ଦିନ ଫଳର ଆକାର -୭୦-୮୦ ଗ୍ରାମ୍ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ ସହନଶୀଳ	୮-୧୦କିଲୋ
ଜେକେ ଦେଶୀ 	ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ନଭେମ୍ବର	ଅମଳ ସମୟ ୮୦-୧୦୦ ଦିନ ଫଳର ଆକାର - ୮୦-୯୦ ଗ୍ରାମ୍ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ ସହନଶୀଳ	୫ କିଲୋ
ଅକି ରକ୍ଷକ 	ଜୁନ- ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫେବୃଆରୀ-ମଇ	ଅମଳ ସମୟ - ୧୧୦-୧୨୦ ଦିନ ଫଳର ଆକାର-୮୦ରୁ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦୂର ବଜାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ	୧୮ କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଚାରା ରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ୨୦ରୁ ୨୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଖେତରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି । ୨୦ ଦିନ ପରେ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଶିଘ୍ର ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯଥାଶିଘ୍ର ଏହାକୁ ରୋପଣ ନ କଲେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ।

ମୁଖ୍ୟ ଖେତ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

- * ୫ରୁ ୬ ଥର ହଳ ।
- * ଢେଲା ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଠ ହେବା ଦରକାର ।
- * ପଟା ମାରି ଜମିକୁ ସମତଳ କରିବା ଦରକାର
- * ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରଣ ।

ତଳି ପଟିରୁ ଚାରା ମୁଖ୍ୟଖେତକୁ କିପରି ନେବେ ?

- * ତଳି ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତଳିପଟିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ନରମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚାରା ଉପୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ଚେର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ।
- * ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ବେଳେ ଚାରାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତଳିପଟିରୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ରୋପଣ କରିବେ ।
- * ୨ ଗ୍ରାମ ରିଡୋମିଲକୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ, ତଳିର ଚେର ଗୁଡ଼ିକୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
- * ଯେତିକି ତଳି ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରୋପଣ କରି ହେବ କେବଳ ସେତିକି ତଳିକୁ ତଳିପାଟିରୁ ଉଠାନ୍ତୁ ।



ପରିସରିବା ତଳି ପକାଇବା ବିଧି

- * ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ି ୨.୫ ଫୁଟ ଏବଂ ଚାରାରୁ ଚାରା ୨ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ ।
- * ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାତରେ ୧କିଲୋ ଗୋବର ଖତ ୧ ଗ୍ରାମ ଫୋରେଟ୍ ପକାଇ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ତଳିକୁ ସିଧା ରଖି ଏହି ଚାରାକୁ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲଭାବେ ମାଟିକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାରା ମୂଳଟି ଖାଲୁଆ ରହି ପାଣି ଜମିବ ନାହିଁ ।
- * ଚାରା ରୋପଣ ସମୟରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପରେ ଚାରା ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।



ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପରିମାଣ

ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ସାର	ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକ	ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା ରୋପଣର ୧୫ ଦିନ ପରେ	ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା: ରୋପଣର ୩୦ ଦିନ ପରେ	ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା: ରୋପଣର ୪୫ ପରେ ଦିନ ପରେ
ଯୁରିଆ (କିଗ୍ରା)	୮ କିଗ୍ରା	୨୫%	୫୦%	୨୫%
ଡି.ଏ.ପି. (କିଗ୍ରା)	୧୦ କିଗ୍ରା	୭୫%	୨୫%	
ପଟାସ୍ (କିଗ୍ରା)	୧୦ କିଗ୍ରା	୭୫%	୨୫%	

ପନିପରିବା ଓଳି ପକାଇବା ବିଧି

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

- * ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ
- * ଷ୍ଟାର ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । (୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ଡି.ଏ.ପି + ୭୫ ଗ୍ରାମ୍ ଏସ୍. ଏସ୍. ପି.କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାନ୍ତୁ)
- * ମିଶିଗଲା ପରେ ୧୩ ଲିଟର ପାଣି ଏହାସହ ମିଶାଇ ପ୍ରତି ଗଛରେ ଗୋଟେ କପ (୨୦୦ ମି.ଲି) ଗଛର ମୂଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ଲଗାଇବା ପରଠାରୁ ଦିନେ ଛଡା ଦିନେ ଷ୍ଟାର ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- * ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ୨-୩ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

ଚାରା ରୋପଣର ୧୧-୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

- * ଜମିରେ ଗାତ ଖୋଳି ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିଛାଇ ସେଥିରେ ୧୫୦ କିଲୋ କୁକୁଡ଼ା/ ଛେଳି ଖତ, ୨୫ କିଲୋ ତେଲ ପିଡିଆ, ୫୦ କିଲୋ ପାଉଁଶ, ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ଅଖା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡେଇ ରଖି ଦିଆଯାଏ । ଏଥିରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମୃତକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । କୋଡାଖୋସା ସମୟରେ ପ୍ରତି ଗଛ ପିଛା ୪୦ରୁ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରାଣୀମୃତ ଏବଂ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ଜିଆଖତକୁ ୪ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ରିଙ୍ଗ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କୀଟନାଶକ ଭାବେ ନିମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଏବଂ ପୋଟାସ୍ ମିଳିଥାଏ ।

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

- * ମାଟି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ ।
- * ଡି.ଏ.ପି. ୬ କିଲୋ, ପଟାସ୍ ୬ କିଲୋ ଏବଂ ଯୁରିଆ ୪ କିଲୋକୁ ମିଶାଇ ଗଛଠାରୁ ୬ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- * ଏକ୍ତାରା ୪ ଗ୍ରାମ୍, ରିଡୋମିଲ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଧାନୁ ଭିର୍ ୪ ଏମ୍. ଏଲ୍ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।



ଚାରା ରୋପଣର ୨୫ରୁ ୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

ଚାରା ରୋପଣର ୨୨-୨୫ ଦିନରେ : ଜୀବାଣୁଜନିତ ଝାଉଁଳା ନ ହେବ ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି. ଦହି (ମଠାସ) କୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସ୍ତେ କରିବା କରିବେ, ଯେପରି ମନ୍ଦାର ମାଟି ୧ ଇଞ୍ଚ ଓଦା ରହିବ ।

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

- * ଏକ୍ତାରା ୪ଗ୍ରାମ୍, ସାପ୍ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍, ଧାନୁଭିଟ୍ ୪ ଏମ୍. ଏଲ୍, ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଯୁରିଆ ପ୍ରତି୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- * ପ୍ରଥମ ସ୍ତେର ୨ ଦିନ ପରେ କ୍ରୋଶିନ୍ ଏଜି ୧ ଗ୍ରାମ୍, ୨ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- * ବର୍ଷାଦିନ ପାଇଁ ମଜବୁତ ସାହାରା ବା ଟେକା ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ସାଧାରଣତଃ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା କାଠ ଦ୍ୱାରା ସାହାରା କିମ୍ବା ତାର ଦ୍ୱାରା ସାହାରା ଦିଆଯାଇପାରିବ ।



ମୁଖ୍ୟ ପୋକ ଏବଂ ରୋଗ



କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ
ଫଳବିନ୍ଧା

ଯେଉଁ ଫଳରେ ପୋକ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ତୋଳି ଜମିଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।

ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଏକାଲାର୍ ୨ ମି.ଲି ଏବଂ ଏସିଫେଟ୍ ୨ ମି.ଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ



ପତ୍ର ମୋଡ଼ା

ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ । ଏହା ଧଳା ମାଛି କିମ୍ବା ଜଉ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଏବଂ ନିମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଏକ୍ଟାରା ୪ ଗ୍ରାମ୍ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।



ଫଳସିଦ୍ଧା ରୋଗ :

ଏହା ଏକ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ।

ଫଳର ଆକାର ମଟର ଦାନା ପରି ହେଇଥିବା ସମୟରେ

ଅମୃତର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ୩

ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

ପତ୍ରପୋଡ଼ା କଳା ଦାଗ ଏବଂ ବୀଜାଣୁଜନିତ ଝାଉଁଳା

ପତ୍ରପୋଡ଼ାର ପ୍ରତିକାର ହେବା ପାଇଁ ମହୁଳାସର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସାଫ୍, ସିକ୍ସର କିମ୍ବା ବ୍ଲୁ କୋପର୍ ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ପତ୍ରଦାଗ ଏବଂ ବୀଜାଣୁଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଠାସର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କ୍ଲୋସିନ୍- ଏଜି କିମ୍ବା ଷ୍ଟେପ୍ଲୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ପତ୍ରପୋଡ଼ା



ପତ୍ର କଳା ଦାଗ



ବୀଜାଣୁଜନିତ ଝାଉଁଳା

ଚାରା ରୋପଣର ୩୫ରୁ ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

- * ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ଲାନେଟିକୁ ୧ ମି.ଲି. ୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
- * ମାପିବା ପାଇଁ ସିରିଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- * ଧାନ ଦେବେ ଯେପରି ମାତ୍ର ଅଧିକ ନ ହୁଏ ନଚେତ ପୁରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା

ଚାରା ରୋପଣର ୩୫ ଦିନରେ : କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଓ ଫଳବିକ୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି. ଆଗ୍ରେୟାସ୍ତ ଗୋଳାଇ ଫସଲରେ ସ୍ତେଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମୟ ସମୟରେ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡି ଝଡିଯାଏ, ଝାଉଁଳିଯାଏ । ଏହା ଏକ ଫିଙ୍ଗିଜନିତ ରୋଗ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଲିଟର ପାଣିରେ ୩ରୁ ୪ ମି.ଲି ମହୁଲ୍ୟାସ୍ତ ଗୋଳାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ । ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ମି.ଲି. ଅମୃତ (ଖସା, ଗହମ, ଚଣା, ମୁଗ, ହରଡ, ରୁମା ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଗାଈ ଗୋବର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ) ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ଚାରା ରୋପଣର ୪୦ ଦିନରେ :	୨ୟ କୋଡାଖୋସା ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ- * ୧୦ ଡେସିମିଲ୍ ପାଇଁ, ୨୫ କିଗ୍ରା ପ୍ରାଣାମୃତ ଏବଂ ୨୦ କିଗ୍ରା ଜିଆ ଖତ ଗଛ କୋଡାଖୋସା କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । * ଗଛରେ କାଣ୍ଡ/ ମୂଳସତ୍ତା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମହୁଲ୍ୟାସ୍ତ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩-୪ମି.ଲି ଗୋଳାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୪୨ ଦିନରେ	କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ନ ହେବା ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି. ଆଗ୍ରେୟାସ୍ତ ଗୋଳାଇ ଫସଲରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୪୪ ଦିନରେ	ଅମୃତ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୫୦ ଦିନରେ	କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଓ ଫଳବିକ୍ଷା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ମି.ଲି ଆଗ୍ରେୟାସ୍ତ ଗୋଳାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
ଚାରା ରୋପଣର ୫୫ ଦିନରେ	ଅମୃତ ସ୍ତେଷ
ଚାରା ରୋପଣର ୬୧ ଦିନରେ	ଆଗ୍ରେୟାସ୍ତ ସ୍ତେଷ

ଚାରା ରୋପଣର ୪୦ରୁ ୭୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ତ୍ରୋ

ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା

୪୧ ଦିନ	ଏକାଲକୁ ୨ ମି.ଲି / ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିକ୍ସର୍ / ସାଫ ୨ ଗ୍ରାମ / ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
୪୪ ଦିନ	ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ/ ମଲ୍ଟିନୋଲ୍/ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ/ ଚମକ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ୩ଗ୍ରାମ/ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
୫୦ ଦିନ	ଏସିଫେଟ୍ ୨ ଗ୍ରାମ / ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିକ୍ସର୍ / ସାଫ ୨ ଗ୍ରାମ / ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
୫୫ ଦିନ	ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ / ମଲ୍ଟିନୋଲ୍ / ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ/ ଚମକ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ୩ ଗ୍ରାମ / ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
୬୧ ଦିନ	ଏସିଫେଟ୍ + ଏକାଲକୁ ୨ ଗ୍ରାମ + ୨ ମି.ଲି. / ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିକ୍ସର୍ / ସାଫ ୨ ଗ୍ରାମ / ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
୬୪ ଦିନ	ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ/ ମଲ୍ଟିନୋଲ୍/ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ / ଚମକ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ୩ ଗ୍ରାମ / ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
୭୧ ଦିନ	ଏକାଲକୁ ୨ ମି.ଲି. / ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିକ୍ସର୍ ସାଫ ୨ ଗ୍ରାମ / ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

ସ୍ତ୍ରୋ କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ :

- * ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ଯୁରିଆ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
- * ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
- * ଫଳ ତୋଳିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
- * ୧ କିଲୋ ଯୁରିଆ ୨ ଥର ଫଳ ତୋଳିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
- * ହରମୋନ୍ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ହରମୋନ୍‌କୁ ଔଷଧ ସହ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା

ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ।

ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତି:

ଅମଳ ପରେ ଜମିରୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଟମାଟୋର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ।


ଏହି କ୍ଷତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

- * ଅଧିକ ପାଚିଯିବାରୁ
- * ଅପରିପକ୍ୱତା ଯୋଗୁଁ
- * ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ
- * ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ୍ ନ ହେବାରୁ





ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ଚରଭୁଜ ଚାଷ



ତରଢୁଜ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ସାଧାରଣତଃ ତରଢୁଜ ଫସଲରେ ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ବିହନ ବିଶୋଧନ, ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା, ତୃଣ ଦମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ, ଅମଳ ଓ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଆଦି କେତେକ ଦିଗ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିସମ ଚୟନ, ଜଳବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା ତଥା ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେତୁ ଏହି ଫସଲର ଅମଳ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

ଜଳବାୟୁ :

ତରଢୁଜ, ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ଭାବେ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, କାରଣ ତାପମାତ୍ରା ୧୮-୨୧ ସେଲସିୟସ୍ ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଗଜା ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଏଣୁ ୨୫-୩୦ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଫସଲର ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକଥିବାରୁ ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷଥର ପାଇଁ ହଳ କରି ମାଟିକୁ ସମତୁଲ କରି ମନ୍ଦାରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହା ଏକ ୯୦ ରୁ ୧୦୦ ଦିନିଆ ଫସଲ ।

ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି :

ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ତରଢୁଜ ଚାଷ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲିଆ, ଦୋରସା, ମୋଟାଳ ମାଟିରେ ଏହି ଚାଷ ଭଲଭାବେ ହୋଇଥାଏ ।

ମାଟିର ଅମ୍ଳ ୫.୫ ରୁ ୭ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଭଲ ଅମଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି :

୩ ରୁ ୪ ଓଡ଼ ଗଭୀର ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।

୪୦୦ କିଲୋ ଚୂନର ପ୍ରୟୋଗ ପୁରାଜମିରେ କଲାପରେ ପୁଣି ଥରେ ହଳ ଚଲାନ୍ତୁ ଯେପରି ଚୂନ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ।



ରୋପଣ ବିଧି

- * ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ି ୪ ଫୁଟ ଏବଂ ଗଛରୁ ଗଛ ୪ ଫୁଟ ଦୂରରେ ମନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- * ମନ୍ଦାର ଆକାର : ୧ ଫୁଟ X ୧ ଫୁଟ X ୧ ଫୁଟ ।
- * ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାରେ ୧ କିଲୋ ଗୋବର ଖତ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ପୋଟାସ୍, ୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ଏନ.ପି.କେ ସାରା ଏବଂ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ଥିମେଟ୍ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାରେ ୩ ଗୋଟି ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁ ।
- * ବିହନକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରି ଲଗାନ୍ତୁ (୧୦ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରାନ୍ତୁ)
- * ଏହାପରେ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ସୁତୀ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଗୋବର ଖତରେ ଘୋଡ଼ାଇ ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ । ୨ ଦିନ ପରେ ଏହା ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଯିବ ।
- * ଜମିରେ ବୀଜ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୫ ଜାନୁୟାରୀରୁ ୧୫ ଫେବୃୟାରୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।



ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାଇବା ବିଧି

- * ତରଭୁଜ ଚାଷରେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ।
- * ଗୋବର ଖତ, ମାଟି ଏବଂ ଧାନ ଚୋକଡ଼ ୪:୨:୨ ଅନୁସାରେ ମିଶାଇ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଲିଷ୍ଟର୍ରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ୨ ଗ୍ରାମ୍ ରିଡୋମିଲ୍‌କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କରି ବୀଜ ପୋତନ୍ତୁ ।
- * ପ୍ରତିଦିନ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।



ରୋପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା

- * ଗଛରେ ୩ରୁ ୪ ପତ୍ର ବାହାରିଲେ ପ୍ରଥମ କୋଡାଖୋସା କରନ୍ତୁ ।
- * ୧୦ ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ପାଇଁ ୪ କି.ଗ୍ରା ଡି.ଏ.ପି ୩ କି.ଗ୍ରା ପୋଟାସ୍ କୁ ମନ୍ଦାରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ କରିଦେଇ ମାଟି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ।
- * ୧୫ରୁ ୨୦ ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଡାଖୋସା କରି ୩ କିଲୋ ଡି.ଏ.ପି ୨ କିଲୋ ପୋଟାସ୍ ଏବଂ ୧ କିଲୋ ଯୁରିୟା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- * ୨ଟି ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫିଙ୍ଗି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ ।
- * ୩ ରୁ ୪ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ଏକ୍ଟାରା ୩ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- * ୨୫ରୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଲ୍ଟିନୋଲ୍, କିମ୍ବା ଚମକ ୩ ଗ୍ରାମ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- * ୪୦ରୁ ୫୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ବୋରନ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଫଳ ଫାଟିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
- * ଗଛର ୨ରୁ ୩ ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଫଳଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ ।



ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ମୂଳସଜା ରୋଗ: ଏହା ଏକ ମାଟିଜାତ ରୋଗ । ଏହାଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଡର ମୂଳଭାଗ ସଜିଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ ଯାହାକି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇଲେ ବଢିଯାଏ ।

ଲକ୍ଷଣ: ମୂଳ ସଜିଯାଏ ଏବଂ ଗଛଟି ମୂଳରୁ ପଡିଯାଏ ।

ପ୍ରତିକାର :

- * ଖରାଟିଆ ହଳ ସମୟରେ ସଜା ଗୋବରର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହି ରୋଗ କମି ଯାଇଥାଏ ।
- * ପାଣି ନ ଜମିଲେ ଏହି ରୋଗ କମିଯାଇଥାଏ ।
- * ଯେଉଁ ଗଛ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ମାଟି ସହ ଉପାଡି ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ପକାନ୍ତୁ ।
- * ଏହି ରୋଗରେ ମଠାସ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।
- * ୨ ଗ୍ରାମ୍ ସାପ୍ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ୍ ବାଉଁଶିନ୍କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ:

- * ୮ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ମି.ଲି ମହୁଲାସ୍ତ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
- * ସାପ୍ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟାକୋଲ୍ ୩ ଗ୍ରାମ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
- * ୮ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ମି.ଲି. ମହୁଲାସ୍ତ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

- * ହାଣ୍ଡିଖତ ଏବଂ ଆଗ୍ନେୟସ୍ତ୍ରକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
- * ପତ୍ରକଟା ପୋକ ପାଇଁ କନସିଡ଼ର୍ ୪ ମି.ଲି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
- * ଫଳମାଛି ପାଇଁ ୧୦ ଡିସିମିଲ୍ ଖେତ ପାଇଁ ୨ରୁ ୩ଟି ଫେରମନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।



ପରିଚାଳନା ସାରଣୀ

କ୍ର.ନଂ.	ସାମଗ୍ରୀ	ମାତ୍ରା	ଦିନ	ମୋଟ
୧.	ବିହନ	୫୦ ଗ୍ରାମ୍		୬୦୦୬୦୦
୨.	ଡି.ଏ.ପି	୧୫ କିଲୋ	୩୦	୪୫୦
୩.	ଚୂନ	୪୦ କିଲୋ	୮	୩୨୦
୪.	ପୋଟାସ୍	୭ କିଲୋ	୨୦	୧୪୦
୫.	ୟୁରିଆ	୨୦ କିଲୋ	୧୦	୨୦୦
୬.	ଥ୍ରମେଟ୍	୧ କିଲୋ	୮୦	୮୦
୭.	ଏକଡାରା	୨୦ ଗ୍ରାମ୍	୨୭/୫ ଗ୍ରାମ୍	୧୦୮
୮.	ବାବିଷ୍ଟିନ୍	୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୧୧୫/୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୧୧୫
୯.	ସାଫ	୫୦ ଗ୍ରାମ୍	୧୮/୨୫ ଗ୍ରାମ୍	୩୬
୧୦.	ଚମକ	୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୪୨/୫୦ ଗ୍ରାମ୍	୮୪
୧୧.	ଫେରମୋନ୍ ଯନ୍ତ୍ର			
			ମୋଟ	୨୧୩୩



ଉତ୍କଳ ପଦ୍ମରେ ଖମ୍ବିଆକୁ ଚାଷ



ଜଳବାୟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଏବଂ କିସମ

ଜଳବାୟୁ: ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚାଷ ଲାଭଜନକ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ । ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଲମ୍ବା ଦିନ ଓ ଆଳୁ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଛୋଟ ଦିନ ଦରକାର । ୨୬-୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପ ରେ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ ।

ମୂର୍ତ୍ତିକା: ନିଗିଡ଼ା, ଉର୍ବର, ଗଭୀର, ବାଲିଦୋରସା ଏବଂ ଅମ୍ଳାୟତା ୫-୮ ଥିବା ମାଟିରେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

କିସମ : ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ୩ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରେ ଖମ୍ବଆଳୁ ଚାଷ କରାଯାଏ ।

କେତେକ ଉନ୍ନତ ଓ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଆଳୁର ପ୍ରକାର	ଉନ୍ନତ କିସମ	ବିହନର ଓଜନ (ଗ୍ରାମ)	ବିହନର ପରିମାଣ (କ୍ୟୁ/ଏକର)	ଲଗାଇବା ଦୂରତା ମନ୍ଦା-ମନ୍ଦା (ସେ.ମି.)	ଗାତର ଆକାର (ସେ.ମି) (ଲମ୍ବ-ପ୍ରସ୍ଥ-ଗଭୀର)
ଛୋଟ	ଶ୍ରୀକଳା	୧୨୫-୧୫୦	୬-୮	୭୫-୭୫	୨୫-୨୫-୨୫
	ଶ୍ରୀ ଲତା				
ବଡ଼	ଶ୍ରୀ ରୂପା	୨୦୦-୨୫୦	୮-୧୦	୯୦-୯୦	୪୫-୪୫-୪୫
	ଶ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି				
ଧଳା	ଶ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରା	୨୦୦-୨୫୦	୮-୧୦	୭୫-୭୫	୪୫-୪୫-୪୫
	ଶ୍ରୀ ଧନ୍ୟା				

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିହନ ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ

- * ଜମିର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ୨ ରୁ ୩ ଓଡ଼ ଗଭୀର ହଳ କରନ୍ତୁ ।
- * ମହି ଦେଇ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡକରି ସମତୁଳ କରନ୍ତୁ ।
- * ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୯୦ ସେ.ମି. ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ୯୦ ସେ.ମି ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୫ ସେ. ମି. ଗଭୀର ଏବଂ ୪୫ ସେ.ମି. ଗୋଲେଇର ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ ।
- * ଜମି ଉପର ଉର୍ବର ମାଟିସହିତ ଗୋବର ଖତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭରନ୍ତୁ ।
- * ପ୍ରତି ଗାତରେ ଗୋଟିଏ ବିହନ ଆଳୁ ୫ରୁ ୮ ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ପୋତି ମାଟି ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ବିହନ ଲଗାଇବା ପରେ ୨ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବା ଛଣ ବିଛାଇଲେ ଅଙ୍କୁରଣ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ।
- * ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ ସାର ଓ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।


ବିହନ ଲାଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ : ଖମ୍ବଆଳୁ ଗୋଟା ଓ କାଟି କରି ଲଗାଯାଏ । ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ କିଲୋ ଗୋବର, ୨୦ ଲିଟର ଗାଈ ପରିଶ୍ରା କିମ୍ବା ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ମେନକୋଜେବ ମିଶାଇ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ କଟା ବା ଗୋଟା ଆଳୁକୁ ୫ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ।



ସାର ପ୍ରୟୋଗ: ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦ ଟନ୍ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସାର ଉପାଦାନ	ଛୋଟ ଖମ୍ବ ଆଳୁ		ଧଳା ଓ ବଡ଼ ଖମ୍ବ ଆଳୁ	
	୩୦-୪୫ ଦିନରେ	୬୦-୭୫ ଦିନରେ	୩୦-୪୫ ଦିନରେ	୬୦-୭୫ ଦିନରେ
ଯବକ୍ଷାରଜାନ	୧୬	୧୬	୩୨	୩୨
ଫୋଟାସିୟମ	୧୬	୧୬	୧୬	୧୬

ଖମ୍ବଆଳୁ ବିହନରୁ ଗଜା ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ରଞ୍ଜାରେ ମଡ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।



ଜଳସେଚନ ଓ ଅନ୍ତଫସଲ

ଜଳସେଚନ :

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ସସ୍ତାହକୁ ଥରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୦ ଦିନରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

ବର୍ଷାଦିନେ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

ଅନ୍ତ ଫସଲ:

ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯେପରିକି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବିନ, କୋଳଥ, ଚଣା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରି ଅତିରିକ୍ତ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇପାରିବ ।



ରୋଗ ପରିଚାଳନା

ଫିଙ୍ଗିଜନିତ ପତ୍ରଦାଗ:

ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ବାଦାମୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳାଦାଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଅମଳ ହ୍ରାସପାଏ ।

ପ୍ରତିକାର :

- * ରୋଗ ସହନୀୟ କିସମର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- * ମହୁଲାସ୍ତ୍ର ୨୫୦ ମି.ଲି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।

ମୋଜାଇକର ଲକ୍ଷଣ:

- * ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ।
- * ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ହଳଦିଆ ଏବଂ ସବୁଜ ମିଶା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ।
- * ଲତାଟି ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ।
- * ଖୟଆଲୁଟି ଛୋଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାତ୍ରା କମିଯାଏ ।

ପ୍ରତିକାର

- * ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ବିହନ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- * ଜମିକୁ ଘାସମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ।



ରୋଗ ପରିଚାଳନା

କନ୍ଦସତା

- * ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୂଳଟି ୧ରୁ ୨ ସେ.ମି. ସଜିଯାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କନ୍ଦଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଜିଯାଇ କଳାରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ ।

କାରଣ:

- * ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଖୋଳିବା ବେଳେ କନ୍ଦରେ କ୍ଷତ ଥିଲେ, ଏଥିରେ ଭୃତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ ।
- * ଜମିରେ ସୂତ୍ରକୃମିର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରତିକାର:

- * ବିହନ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ କୃଷି ଅବଶେଷକୁ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ଜମିରେ ପାଉଁଶ, ନିମ୍ବ ପିଡିଆର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ମିଲିବର୍ (ଶୋଷକ କୀଟ)

- * ଏହାଏକ ଶୋଷକ କୀଟ ଯାହା ପତ୍ର କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷିତ କନ୍ଦରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ପ୍ରତିକାର :

- * ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦ ମି.ଲି. ହାଣ୍ଡିଖତ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ । କିମ୍ବା ଏକ୍ତାରା ୦.୫ ଗ୍ରାମ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।



ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଅମଳ

ପଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡି ଶୁଖୁଆସିଲେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଅମଳ କରାଯାଏ । ଛୋଟ ଖମ୍ବଆଳୁ ୭-୮ ମାସରେ ଏବଂ ବଡ଼ ଓ ଧଳା ଖମ୍ବ ୯-୧୦ ମସାରେ ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଖୋଳିବା ପରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିଦେବା ଉଚିତ୍ । ଆଳୁକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ମାଲିକ୍ ହାଇଡ୍ରାଜାକଡ୍ (୧ଗ୍ରାମ/ଲିଟର) ଦ୍ରବଣ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ବୁଡାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖିଲା ପରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ଖମ୍ବ ଆଳୁରେ ଗଜା ବାହାରିଲେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏକର ପ୍ରତି ହାରାହାରି ୮୦-୧୫୦ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ୍ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ ।




ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂରକ୍ଷଣ

ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି କରିବେ ?

- * ଜାଗା ଶୁଖିଲା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- * ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପବନ ଚଳଚଳ ହେଉଥିବ ।
- * ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।
- * ଏହାକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
- * ଖମ୍ବଆଳୁ କୁ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂରକ୍ଷଣ ମଡେଲ



ଉନ୍ନତ ପଦ୍ମରେ ପୋଟଳ ଚାଷ



୧୦ ଦେସିମିଲ୍ ଜମିରେ ପୋଟଳ ଚାଷ

ବିହନ ଚୟନ ଓ ବିଶୋଧନ

- * ଚେର ଦ୍ଵାରା ବଂଶବିସ୍ତାର ।
- * ପୋଟଳରେ ମାଛ ଓ ଅଣ୍ଟିରା ଚେର ଓ ଫୁଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ।
- * ମାଛ ଚେର ଚିକିଣିଆ, ମସୃଣ ଥାଏ, ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ତଳପଟରୁ ସରୁ ହୋଇଥାଏ ।
- * ମାଛ ଓ ଅଣ୍ଟିରା ଚେର ଚିହ୍ନଟ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ।
- * ବହୁତ ମୋଟା କିମ୍ବା ସରୁ ଚେର ନବାଛି ବୁଢ଼ା ଆଜୁଳି ମୋଟାର ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ।
- * ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍, ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ଓ ୧୫ ମିଲି ମନୋକ୍ସିଡୋସିନ୍ ପକାଇ ଚେରକୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ।
- * ପ୍ରତି ୭:୧ ଅନୁପାତରେ ମାଛ ଚେର ଓ ଅଣ୍ଟିରା ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ଲଗାନ୍ତୁ ।



ବିହନ ଚୟନ ଓ ବିଶୋଧନ

ଡ଼ଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର

- * ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ୨-୩ ଗଣ୍ଠି ଥିବା ୧୦-୧୫ ସେ.ମି ଲମ୍ବ ପାକଳ ଡ଼ାଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ।
- * ୧ ଲିଟର ପାଣି ରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଓ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ମନୋକ୍ସିଡୋସିନ୍ ମିଶାଇ ଡ଼ଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡକୁ ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- * ରୁଟେକ୍ସ ବା ସେରାଡ଼ିକ୍ସ ୧ ସହ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ବହଳିଆ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁରେ ଡ଼ଙ୍ଗ ତଳ ଅଂଶକୁ ବୁଡ଼ାଇ ବାଲିରେ ପୋତନ୍ତୁ ।
- * ୩୦ ଦିନ ପରେ ଏହି ଡ଼ଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡକୁ ମାଟି, ଖତ ଓ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜରି/ମୁଣାରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ୭୦-୮୦ ଦିନରେ ଚାରା କୁ ଜମି ରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।



ମନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚାରା ରୋପଣ ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା

୧) ଜମିକୁ ହଳ କରି ଘାସ ପତ୍ର ବାଛିଦିଅନ୍ତୁ ।

୨) ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୫ ଫୁଟ ଓ ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା ୪ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ (୧.୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବା, ୧.୫ ଫୁଟ ଓସାର ଓ ୧.୫ ଫୁଟ ଗଭୀର) ମନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

୩) ଚେର କିମ୍ବା ଚାରା ଲଗାଇବାର ୩ ଦିନ ଆଗରୁ ମନ୍ଦା ପ୍ରତି ୨ କି.ଗ୍ରା ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତ, ୫୦ ଗ୍ରାମ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ୩୦ ଗ୍ରାମ ଡି.ଏ.ପି. ୧୦ ଗ୍ରାମ ପଟାସ୍ ଓ ୩-୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

୪) ଚେର ମନ୍ଦାରେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ଉଠିଥାଏ ।

୫) ଚେର ବା ଡ଼ଙ୍କ ଲଗାଇବାର ୪-୫ ଦିନ ପରେ କାର୍ବୋଷ୍ଟାଜିନ୍ ୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳ ଓ ମାଟିକୁ ଓଦା କରନ୍ତୁ ।

୬) ଲଗାଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦାପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଯୁରିୟା ସହ ୧୦ ଗ୍ରାମ ଯୁରିୟା ସହ ୩-୪ ଗ୍ରାମ ଅଣୁସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

୭) ଲଗାଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦାପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଯୁରିୟା ସହ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପଟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

୮) ୧୦୦ ଦିନ ବେଳକୁ ମନ୍ଦାପ୍ରତି ୧୫ ଗ୍ରାମ ଯୁରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

୯) ୧୫୦ ଦିନ ବେଳକୁ ମନ୍ଦାପ୍ରତି ୧୫ ଗ୍ରାମ ଯୁରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

୧୦) ଗଛ ଲଗାଇବାର ୨ ମାସ ଓ ୪ ମାସରେ ପ୍ଲାଡ଼େ (୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ) କିମ୍ବା ଟ୍ରାସେଲ (Tracel) (୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ) କିମ୍ବା ଆଗ୍ରୋମିନ୍ (୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ମି.ଲି) ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।



ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ

- ୧) ବର୍ଷାଦିନରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ୨) ଖରାଦିନରେ ଜମିର ବତର ଦେଖି ପ୍ରତି ୫ ରୁ ୭ ଦିନରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ୩) ଚେର ଗଜା ହୋଇ ଡଙ୍ଗ ତଳେ ମାଡ଼ିଲେ ରଞ୍ଜା ଦେଇ ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦିଅନ୍ତୁ ।
- ୪) ଫଳ ଓ ଫୁଲ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭିପୁଲ୍ (Vipul), ମିରାକୁଲାନ (Miraculan) ଫାନ୍ଟାକ୍ (Fantac), ଡବଲ୍ (Double), ସିଆପଟ୍ରନ୍ ଆଦି ଯେକୌଣସି ହରମୋନ୍ ୭.୫-୧୦ ମିଲି. ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୨ ର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- ୫) ଗଛର ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ହେଉଥିଲେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଯୁରିୟା ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- ୬) ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ଡଙ୍ଗ ଶୁଖିଯାଏ । ତେଣୁ ଜାନୁୟାରୀ ମାସରେ ଡଙ୍ଗ କାଟି କୋଡ଼ା ଖୋଷା କରି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ରୋଗ ଯୋଜ ପରିଚାଳନା

ମୂଳ ସତ୍ତା ରୋଗ

- ୧) ଏହି ରୋଗର ଗଛର ମୂଳ ସତ୍ତାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମରିଯାଏ ।
- ୨) ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ଓ କମ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ସହ ଅନୁମୋଦିତ ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ୩) ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ରିଡ଼ୋମିଲ୍ ଓ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ (Plantomycin)
- ମିଶାଇ ମୂଳ ଓ ମୂଳପାଖ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ୪) ୮-୧୦ ଦିନ ପରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ (Metalaxl) ମେଟାଲିକ୍ସ ଓ ମାନକୋଜେବ୍ ମିଶ୍ରିତ ଔଷଧ ସହ ୧ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପୂର୍ବ ପରି ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।



ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ

- ୧) ଏହି ରୋଗରେ ତଳ ପତ୍ର ସବୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୁଖିଯାଏ ଓ ପତ୍ରର ଧାରରୁ ପୋଡ଼ିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ ।
- କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧୨%+ମାନକୋଜେବ୍ ୬୫% ଡ୍ରବ୍ୟୁ.ପି ୨ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ମେଟାଲାଇକ୍ସିଲ୍ ୮% + ମାନକୋଜେବ୍ ୬୫% ଡ୍ରବ୍ୟୁ.ପି ୨ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ମେଟାଲାଇକ୍ସିଲ୍ ୮% + ମାନକୋଜେବ୍ ୬୫% ଡ୍ରବ୍ୟୁ.ପି ୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ରୋଗ ଯୋଜ ପରିଚାଳନା

ପତୁଣ୍ଡା ନେଳିଯୋଜ

୧) ଏହି ଯୋଜ ଗଛରୁ ପତ୍ରକୁ କଣାକରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି । ଗଛ ଥୁଣ୍ଡା ହୋଇ ଭଲ ବଢ଼େ ନାହିଁ ।

୨) ଟ୍ରାଇଫୋସ୍ (Triazophos) ବା କ୍ୱିନାଲଫୋସ୍ (Quinalphos) ୨ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୦-୧୨ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଥର ସ୍ତେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।



ଫଳ ମାଛି :

୧) ଫଳ ମାଛି ଫଳକୁ କଣା କଲେ ଫଳ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ । ଭାଙ୍ଗିକରି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଧଳା ସୂକ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ଫଳ ବଙ୍କା ହୋଇ ଅଠା ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।

୨) ରାତିରେ ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

୩) ୧୧୦ ମି.ଲି. ମହୁ / ଫଳରସ, ୨୦-୩୦ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼, ୨ ମି.ଲି. ମାଲାଥ୍‌ଆନ୍ କୁ ୪ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଥୋପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସରାରେ ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିଲେ ତାକୁ ଖାଇ ଫଳମାଛି ମରିଯାଆନ୍ତି ।

୪) କ୍ଲୋରୋପାରିଫୋସ୍ ୨ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।



ରୋଗ ଯୋଜ ପରିଚାଳନା

ଫଳ ପତା ରୋଗ :

- ୧) ପୋଚଳ ଫଳ ଉପରେ ପାଣି ଭିଜା ଦାଗ ପରି ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଓ ପରେ ଫଳ ସଢ଼ିଯାଇଥାଏ ।
- ୨) ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଲେ ୮-୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ କପର ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ (Copper Hydroxide-77% wp) ୭୭% ଡବ୍ଲୁ. ପି. (Metalixyl 8%+Mancozeb 64% wp) ୨.୫ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଅପାୟୋଫାରେଟ ମିଥାଇଲ୍ - ୭୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. (Thiophenate Methyl - 70% wp) ୦.୪ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।



ଡଙ୍ଗ ଓ ଚେର ବିନ୍ଧା ପୋକ :

- ୧) ପୋକର ଶୁକ କଣା କରି କାଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଓ ସେହି ସ୍ଥାନ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ । ଅଗ ଡଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଶୁଖିଯାଏ ।
- ୨) ଚେର ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚେର ବା କାଷ୍ଠ କୁ ମନକ୍ରୋଟଫସ୍ ଦ୍ରବଣ (Manocrotophos) (ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ମି.ଲି) ରେ ୧୦ ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
- ୩) କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟୁନାଲ୍‌ଫସ୍ ୨ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।



ଟାଷ ପାଇଁ କୀଟ ନାଶକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ ରେ ନିମ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

- ⇒ ସ୍ତ୍ରୋ କଲାବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କୀଟନାଶକ ଠାରୁ ଦୂରରେଖନ୍ତୁ ।
- ⇒ କୀଟନାଶକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ⇒ ସ୍ତ୍ରୋ ବୟସ୍କ ଲୋକ କରନ୍ତୁ । ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଏହି କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ⇒ ସ୍ତ୍ରୋ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ପବନ ବୋହୁଥିବ, ସେହି ଦିଗକୁ ପିଠି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ।
- ⇒ ସ୍ତ୍ରୋ କଲାବେଳେ ନାକ ଏବଂ ମୁହଁକୁ କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କନ୍ତୁ, ଦେହରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବିଷ ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୋ କରିସାରିଲା ପରେ ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୋ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ।
- ⇒ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଡବା କିମ୍ବା ପ୍ୟାକେଟକୁ ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ⇒ ଧୋଇକରି ଏହି ଡବା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ପିଲା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ⇒ ଶରୀରରେ କୀଟନାଶକ ପଡ଼ିଗଲେ, ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ।
- ⇒ ଆଖିରେ କୀଟ ନାଶକ ପଡ଼ିଗଲେ ସଫା ପାଣି ରେ ପ୍ରଥମେ ଆଖି ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।
- ⇒ ସ୍ତ୍ରୋ କଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲେ କିମ୍ବା ଦେହ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।





ସମୋନ୍ମିତ ରୋଗ ଯୋଜ ପରିଚାଳନା



କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫଳ ବିଜ୍ଞା ର ପ୍ରତିକାର

- କୀଟ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମିତ ବାଇଗଣ ଗଛ ଓ ଫଳ କୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏକର ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୬ ଫେରୋମୋନ୍ ଯନ୍ତ୍ରା ଲଗାନ୍ତୁ । ଅଣ୍ଟିରା ପୋକ କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ।
- ଏହି ଯନ୍ତ୍ରା କୁ ଖେତ ରେ ଫସଲ ଉଚ୍ଚତା ରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ କୀଟ ତାହା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ ।
- କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଏକର ୨ ରୁ ୩ ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ଛିଲୋନିସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଟ୍ରାଇକୋ-କାର୍ଡ଼ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳ ରେ ୩ ମି.ଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ନିମାର୍କ ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।



ହଳଦିଆ ଅଠା ଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର (yellow sticky trap)

ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ପୋକ

- ଧଳା ମାଛି
- ଶୋଷକ ପୋକ

କ୍ଷତି ଗ୍ରସ୍ତ ଫସଲ :


ମୁଖ୍ୟତ ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫୁଲ ଚାଷ ରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଥାଏ ।

ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ?

ସାଧାରଣତଃ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଶୋଷକ କୀଟ ଏବଂ ରୋଗର ବାହକ ମାଛି ଯେପରିକି ଧଳା ମାଛି ଆଦିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଏହି ପୋକ ଏବଂ ମାଛି ମାନେ ଏହି ଟ୍ରାପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଥିବା ଅଠା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ପୋକ ଏବଂ ମାଛିଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ଫସଲରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

ବ୍ୟବହାର :

- ଏକ ଏକର ପାଇଁ ୮ ରୁ ୧୦ ଟି ଟ୍ରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।
- ଏହାକୁ ଚାଷୀ ମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ଉପଯୋଗ କରି ପାରିବେ ।
- ହଳଦିଆ ଟିଣ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସିଂ ଉପରେ ଜଡ଼ାତେଲ/ଅନ୍ୟକୌଣସି ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗା ଯାଇ ପାରିବ ।
- ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାକୁ ସଫା କରି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ।




ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର (Light trap)

ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ପୋକ :

- ପତ୍ରକଟା ପୋକ
- କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ
- ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ
- ଡିଆଁପୋକ (ହୋସ୍ତର)
- ସମସ୍ତ ମାଛି
- ଅନ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ

ବ୍ୟବହାର :

- ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଅତି କମରେ ୨ ରୁ ୩ ଟି ଆଲୋକଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଅତି କମରେ ୧୦୦ ଫୁଟ ର ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହାକି କୀଟ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
- ଫସଲ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ରେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଏହାର ଆଲୋକ ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଯିବ ।
- ବିଜୁଳି ତାରକୁ ସୁକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେପରିକି କେହି ବିଜୁଳି ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ନହେବେ ।
- ସୋଲାର / ସୌରଚାଳିତ ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଲୋକ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ କୀଟ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ।



ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର (pheromone trap)

ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ପୋକ :
ଫଳ ଛେଦକ କୀଟ



ବ୍ୟବହାର :

- ଏକ ଏକର ଫସଲ ପାଇଁ ୫ଟି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନ କୀଟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫେରୋମନ ବା ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ପକ୍ଷୀ ଆକର୍ଷଣ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ପକ୍ଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶରେ ଏକ ଭାରା ଭଳି ଜିନିଷ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ଟି ଜମିରେ ପୋତିଦେଲେ ଉପକାରୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି ଓ ଅପକାରୀ କୀଟକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ।



କିଛି ଉପକାରୀ ମିତ୍ର କୀଟ



ଝାଞ୍ଜ WASP



ଲେଡି ବଗ୍



ପାଇରେଟ ବଗ୍



ଡାମସେଲ ବଗ୍



ଟାଟିନିଡ଼ ଫ୍ଲାଇ



ଡ୍ରାଗୋନ ଫ୍ଲାଇ



ରୋବର ଫ୍ଲାଇ



ବୁଡ଼ିଆଣୀ



ପ୍ରେୟିଙ୍ଗମଣ୍ଡିଡ଼



ବିଗ ଆଏଡ଼ ବଗ୍



ରେଡୁଭିଡ଼ ବଗ୍



ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଟଲ



ଫାର୍ମାର ଆଣ୍ଟ

ଉପକାର :

- ଉପରୋକ୍ତ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ଫସଲରେ ଦେଖାଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ, ଏମାନେ ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପକାରୀ ବା ମିତ୍ରକୀଟ କୁହାଯାଏ ।
- ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
- ବିଭିନ୍ନ ଶୋଷକ କୀଟ ଏବଂ ଅପକାରୀ କୀଟ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା, ଲାର୍ଭା ଆଦିକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ।

ଖରାଟିଆ ହଳ ଏବଂ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମିଳୁଥିବା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରାଯାଏ ।

ଖରାଟିଆ ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା :

- ଜମିରୁ ପୋକ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା, କୋଷ, ଏବଂ ଫିଙ୍ଗି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।
- ଅନା ବନା ଘାସ ସବୁ ମରିଯାଏ ।
- ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ ହୁଏ ଏବଂ ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିପାଏ ।
- ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳିରେ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ହୋଇ ଜମିରେ ଉପଯୋଗ ହୁଏ ।

ମାଟିରେ ଅମ୍ଳ ଅଧିକ ହେଲେ ରୋଗ ଏବଂ ପୋକ ସହଜରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଫସଲ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ହଳ କରିବା ସମୟରେ ଏକର ପିଛା ୪ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ଦେଶୀୟ ବିହନର ଚୟନ

ସାଧାରଣତଃ ଦେଶୀୟ ବିହନ, ଆଧୁନିକ ବିହନ ଠାରୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ । ଦେଶୀୟ ବିହନରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଖତ (ଗୋବର ଖତ, ଜିଆ ଖତ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଅଳ୍ପ ଫସଲ

ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ସହ କିଛି ଫସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେପରିକି ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ଯାହାର ଗନ୍ଧରେ ଅନେକ କୀଟ ମୁଖ୍ୟ ଖେତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେହିପରି ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଲଗାଇଲେ, କୀଟମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ ।



ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅପକାରୀ କୀଟ ମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯାଏ । ଏଣୁକରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।

ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ର କିଛି ନିୟମାବଳୀ

୧. ବଜାର ରୁ କିଣା ଯାଇଥିବା ବିହନ, ସାଧାରଣତଃ ରାସାୟନୀକ ଔଷଧରେ ଉପଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ସମନ୍ୱିତ

ଏବଂ ଜୈବିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବିହନ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ୫୦% ଗାଈ

ପରିଶ୍ରାରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ।

୨. ଉନ୍ନତ ମାନର ଦେଶୀ ବା **OP** ବିହନ ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

୩. ବିହନ ଏବଂ ମାଟି କୁ ଉପଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ **NPK** କୋନସୋଟିଆ, ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା, ସୁଡୋମୋନାସ

ଏବଂ ମାଇକୋରାଇଜା ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

୪. ତଳି ରୋପଣ ସମୟରେ ଗୋବର ଖତ, **NPK** କୋନସୋଟିଆ, ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା, ସୁଡୋମୋନାସ ର

ପ୍ରୟୋଗ ଗାତରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜିବାମୃତ ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଡି. କମ୍ପୋଜର ର ବ୍ୟବହାର

କରନ୍ତୁ ।

୫. ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୫୦୦ ଏମ୍ ଏଲ୍ ହାଣ୍ଡିଖତ, ୫୦୦ ଏମ୍ ଏଲ୍ ମଠାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ୫୦୦ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଅଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର

ମିଶାଇ ପତ୍ର ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।

୬. ତଳି ପଟିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ରୋପଣର

ଅତି କମରେ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ନାହିଁ ।



